

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 17**

Prof: Brabeceanu Silvia

♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.

♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$a_4 = 54, q = 3 \text{ și } a_1 = 2$ $S_6 = \frac{a_1(q^6 - 1)}{q - 1} = 728$	3p 2p
2.	<p>Ecuatia $mx^2 - (m+1)x + m = 0$ are soluții reale egale $\Leftrightarrow \Delta = 0$.</p> $b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow (m+1)^2 - 4 \cdot m \cdot m = 0$ $-3m^2 + 2m + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} m_1 = 1 \\ m_2 = -\frac{1}{3} \end{cases}$	1p 1p 3p
3.	<p>Condiții $\begin{cases} x+3 > 0, x \in (-3, +\infty) \\ 2x-1 > 0, x \in (\frac{1}{2}, +\infty) \end{cases} \Rightarrow x \in (\frac{1}{2}, +\infty)$</p> $\log_2(x+3) + \log_2(2x-1) = 2 \Rightarrow (x+3)(2x-1) = 4$ $2x^2 + 5x - 7 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-5 + \sqrt{53}}{4} \\ x_2 = 1 \end{cases}$	2p 1p 2p
4.	<p>Numerele naturale $\overline{abc}$ scrise cu cifrele 1 și 2, corespund funcțiilor $f: \{a, b, c\} \rightarrow \{1, 2\}$ care sunt în total $2^3 = 8$, deci sunt 8 numere: 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222.</p>	3p

	Favorabile cerinței de a fi divizibile cu 4 sunt doar două dintre ele: 112 și 212 .	1p
	Probabilitatea cerută este $p = \frac{2}{8} = 0,25$	1p
5.	CM - mediatoarea segmentului $AB \Rightarrow C$ mijlocul segmentului și $CM \perp AB$.	1p
	$\left. \begin{aligned} x_C &= \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1}{2} \\ y_C &= \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow C\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$	1p
	$CM \perp AB \Rightarrow m_{CM} \cdot m_{AB} = -1 \Rightarrow m_{CM} = \frac{1}{3}$	1p
	$CM : y - y_C = m_{CM} (x - x_C) \Rightarrow CM : x - 3y + 1 = 0$	2p
6.	Se utilizează formula lui Heron: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ unde $p = \frac{a+b+c}{2}$ este semiperimetrul triunghiului.	2p
	$p = \frac{6+7+11}{2} = 12$	1p
	$S = \sqrt{12(12-7)(12-11)(12-6)} = 6\sqrt{10}$	2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -12 & 12 \end{pmatrix} \text{ și } 2A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -6 & 6 \end{pmatrix}$	2p
	$A^2 - 2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$	2p
	$2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = 2A$	1p
b)	Din a), $\Rightarrow A^2 = 4A$	1p
	$X(a) \cdot X(b) = (I_2 + aA) \cdot (I_2 + bA) = I_2 + aA + bA + abA^2$	2p
	$X(a) \cdot X(b) = I_2 + aA + bA + ab(4A) = I_2 + (a + b + 4ab)A = X(a + b + 4ab)$	2p

c)	$X(a)$ este inversabilă $\Leftrightarrow \det(X(a)) \neq 0$ $X(a) = I_2 + aA = \begin{pmatrix} 1+a & -a \\ -3a & 1+3a \end{pmatrix}$ $\det(X(a)) = \begin{vmatrix} 1+a & -a \\ -3a & 1+3a \end{vmatrix} = 1+4a$ $\forall a \in \mathbb{Z}, 1+4a \neq 0 \Rightarrow X(a) \text{ inversabilă}$	2p 1p 1p 1p
2.	$m=3 \Rightarrow f = X^3 + X^2 - 15X + 4$	1p
a)	Împărțirea obișnuită sau schema lui Horner $q = X^2 + 3X - 9, r = -14$	3p 1p
b)	Efectuarea împărțirii f divizibil cu $X+4 \Leftrightarrow r=0$ $r=0 \Rightarrow 17m-35=0 \Rightarrow m = \frac{35}{17}$	2p 1p 2p
c)	Relațiile lui Viete $\begin{cases} S_1 = 1 \\ S_2 = -15 \\ S_3 = -2 \end{cases}$ $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = S_1^2 - 2S_2 = 31$ $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - 15(x_1 + x_2 + x_3) + 6 = 0,$ $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 15(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) - 6 = 40$	1p 2p 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	$f'(x) = (2^x - x \ln 2)'$	2p
a)	$f'(x) = (2^x - 1) \ln 2$	3p

b)	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = \ln 2$	2p 3p
c)	$f'(x) = 0 \Rightarrow (2^x - 1) \ln 2 = 0$ $\ln 2 > 0$ $2^x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0$	1p 2p 2p
2. a)	$I_0 = \int_0^1 \sqrt{1-x} dx. \text{ Subst. } \sqrt{1-x} = t \Rightarrow \begin{cases} x=0 \Rightarrow t=1 \\ x=1 \Rightarrow t=0 \end{cases}; dx = -2\sqrt{1-x} dt \Rightarrow I_0 = 2 \int_0^1 t^2 dt = \frac{2}{3}$ $I_1 = \int_0^1 x \sqrt{1-x} dx = 2 \int_0^1 (t^2 - t^4) dt = \frac{4}{15}$	3p 2p
b)	<p>Se aplică metoda integrării prin părți</p> $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} dx = \frac{2n}{3} \int_0^1 x^{n-1} \sqrt{1-x} dx - \frac{2n}{3} \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} dx$ $I_n = \frac{2n}{3} I_{n-1} - \frac{2n}{3} I_n$ $I_n \left(1 + \frac{2n}{3} \right) = \frac{2n}{3} I_{n-1} \Rightarrow I_n = \frac{2n}{2n+3} I_{n-1}$	1p 2p 1p 1p
c)	$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} \sqrt{1-x} dx$ $\forall x \in [0,1] \Rightarrow x^{n+1} \leq x^n \text{ și cum } 0 \leq 1-x \leq 1 \Rightarrow x^{n+1} \sqrt{1-x} \leq x^n \sqrt{1-x}$ $\text{Deci } \int_0^1 x^{n+1} \sqrt{1-x} dx \leq \int_0^1 x^n \sqrt{1-x} dx \Rightarrow I_{n+1} \leq I_n \Rightarrow (I_n)_{n \geq 0} \text{ descrescător}$	1p 2p 2p