

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 18**

Prof: Brabeceanu Silvia

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	<p>Raționalizarea fiecărei fracții sau aducerea la același numitor</p> $\frac{(2+3i)^2 + (2-3i)^2}{13} = \frac{-10}{13}$ <p>Finalizare $\frac{-10}{13} \in \mathbb{Q}$</p>	<p>1p</p> <p>3p</p> <p>1p</p>
2.	<p>Pentru ca să existe intervalul I se pune condiția: $\frac{x^2+1}{2} \leq \frac{3x+4}{4}$</p> $2x^2 - 3x - 2 \leq 0$ <p>Finalizare $x \in \left[\frac{-1}{2}, 2 \right]$</p>	<p>1p</p> <p>3p</p> <p>1p</p>
3.	<p>$A(-1,1) \in G_f \Rightarrow f(-1)=1$ și $B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) \in G_f \Rightarrow f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}$</p> <p>Rezolvarea sistemului $\begin{cases} -3a+2b=1 \\ 2a+4b=3 \end{cases} \Rightarrow S = \left\{ \left(\frac{1}{8}, \frac{11}{16} \right) \right\}$</p>	<p>2p</p> <p>3p</p>
4.	<p>Fie x - prețul inițial. $x - 18\%$ din $x = 820$.</p> $x - \frac{18}{100}x = 820 \Rightarrow \frac{41}{50}x = 820$	<p>2p</p> <p>2p</p>

	$x = 1000$	1p
5.	$\overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{BA} + 2\vec{u} - 3\vec{v} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ $(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) + 2\overrightarrow{AB} + 2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}) = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CB}$	2p 3p
6.	$m(C) = 30^\circ \Rightarrow BC = 2 \cdot AB = 40\sqrt{3}$ Din teorema catetei $AB^2 = BC \cdot BD \Rightarrow BD = 10\sqrt{3}$ $CD = BC - BD = 30\sqrt{3}$ Se aplică teorema înălțimii $AD^2 = BD \cdot DC = 30$	1p 2p 1p 1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$A_1(1,2)$ și $A_2(2,5)$ Ecuția dreptei A_1A_2 : $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$ $A_1A_2: 3x - y - 1 = 0$	1p 2p 2p
b)	Punctele A_1, A_2, A_n sunt coliniare dacă determinantul $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ n & n^2+1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ $n^2 - 3n + 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} n_1 = 1 \\ n_2 = 2 \end{cases}$	2p 3p
c)	$A_{\triangle A_1 A_2 A_3} = \frac{1}{2} \Delta $ $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 10 & 1 \end{vmatrix} = 2$ $A_{\triangle A_1 A_2 A_3} = \frac{1}{2} 2 = 1$	2p 2p 1p

2.	$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x \perp y = \frac{1}{2}(xy - x - y + 1 + 2) = \frac{1}{2}(xy - x - y + 1) + 1$	2p
a)	$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad \frac{1}{2}(xy - x - y + 1) + 1 = \frac{1}{2}[x(y-1) - (y-1)] + 1 = \frac{1}{2}(x-1)(y-1) + 1$	3p
b)	$5^x \perp 3^{x-3} = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}(5^x - 1)(3^{x-1} - 1) + 1 = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}(5^x - 1)(3^{x-1} - 1) = 0$	3p
	$5^x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0$	1p
	$3^{x-3} - 1 = 0 \Rightarrow x = 3$	1p
c)	$x \perp x \perp x \perp x \perp x = (x \perp x) \perp (x \perp x) \perp x = \left[\frac{1}{2}(x-1)^2 + 1 \right] \perp \left[\frac{1}{2}(x-1)^2 + 1 \right] \perp x$	2p
	Se aplică în continuare a).	2p
	Finalizare $x \perp x \perp x \perp x \perp x = \frac{1}{2^4}(x-1)^5 + 1$	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	Asimptota oblică are ecuația $y = mx + n, m \neq 0$	1p
a)	$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$	2p
	$n = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = 1$	1p
	$y = x + 1$	1p
b)	$f'(x) = \frac{x^2 + 6x + 8}{(x+3)^2}$	2p
	$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 + 6x + 8 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -4 \\ x_2 = -2 \end{cases}$	1p
	Din tabloul de variație al funcției rezultă că x_1, x_2 sunt puncte de extrem	2p

c)	$L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{f(x)}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 + 3x} \right)^x \text{ caz exceptat } 1^\infty$ $L = e^l = e^1 = e$ $l = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 4x}{x^2 + 3x} = 1$	1p 3p 1p
2. a)	$\frac{6}{9+x^2} \leq \frac{1}{x} \Leftrightarrow 6x \leq 9+x^2$ $0 \leq 9+x^2-6x \Leftrightarrow 0 \leq (3-x)^2$ $(3-x)^2 \geq 0 \text{ adevărat pentru } \forall x \in (0, +\infty)$	1p 2p 2p
b)	$\int_1^{\sqrt{3}} f(x) dx = 6 \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{9+x^2} dx = 6 \cdot \frac{1}{3} \arctg \frac{x}{3} \Big _1^{\sqrt{3}}$ $\int_1^{\sqrt{3}} f(x) dx = 2 \left(\frac{\pi}{6} - \arctg \frac{1}{3} \right)$	3p 2p
c)	<p>Integrând relația de la pct a) avem: $\int_1^e f(x) dx \leq \int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln x \Big _1^e = 1$</p> <p>Folosind pct b) avem: $2 \left(\arctg \frac{e}{3} - \arctg \frac{1}{3} \right) \leq 1$</p> $\arctg \frac{e}{3} \leq \frac{1}{2} + \arctg \frac{1}{3}$	2p 2p 1p