

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 24**

Prof: Dogaru Ion

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$(1+i)^4 = -4$; $(1-i)^4 = -4$; $(1+i)^{2012} - (1-i)^{2012} = (-4)^{503} - (-4)^{503} = 0$	1p 1p 3p																																																			
2.	$\begin{cases} 11x+4 \geq 0 \\ x-2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow x \geq 2$; $x^2 - 15x = 0 \Leftrightarrow x=0$ și $x = 15$; Soluția ecuației: $x = 15$	2p 2p 1p																																																			
3.	$a_6 = a_3 + 3r$; $a_{16} = a_{19} - 3r$; $a_3 + a_{19} = a_6 + a_{16} = 2012$	1p 1p 3p																																																			
4.	$x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$; $x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$; <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-2</td><td>-1</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>x+2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>x^2-1</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>$(x+2)(x^2-1)$</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td><td>+</td></tr></table> $x \in [-2, -1] \cup [1, +\infty]$	x	$-\infty$	-2	-1	1	$+\infty$	x+2	-	-	-	0	+	+	+	+	+	+	+	x^2-1	+	+	+	+	+	+	0	-	-	0	+	+	+	+	$(x+2)(x^2-1)$	-	-	-	-	0	+	+	+	0	-	-	0	+	+	+	+	+	2p 2p 1p
x	$-\infty$	-2	-1	1	$+\infty$																																																
x+2	-	-	-	0	+	+	+	+	+	+	+																																										
x^2-1	+	+	+	+	+	+	0	-	-	0	+	+	+	+																																							
$(x+2)(x^2-1)$	-	-	-	-	0	+	+	+	0	-	-	0	+	+	+	+	+																																				
5.	Fie M mijlocul segmentului [AB] $\Rightarrow M(-1,2)$; $m_{AB} = -1 \Rightarrow m' = 1$; Ecuația mediatoarei lui [AB]: $x - y + 3 = 0$	1p 2p 2p																																																			
6.	$\sin^2 x - \cos^2 x = \cos x \Leftrightarrow 2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$; $\cos x = -1 \Rightarrow x \in \{\pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; $\cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x \in \{\pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; $x \in [0, 2\pi] \Rightarrow x \in \{\pi, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}\}$	1p 1p 2p 1p																																																			

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1, \Rightarrow \text{rang} M \geq 2, \forall m \in \mathbb{R}$; $\det M = m^2 - 6m + 5$; $\text{rang} M = 2 \Leftrightarrow \det M = 0 \Leftrightarrow m = 1 \text{ sau } m = 5$	2p 2p 1p
b)	A, B, C sunt necoliniare $\Leftrightarrow \det M \neq 0$; $m^2 - 6m + 5 \neq 0 \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{1, 5\}$	3p 2p
c)	$A_{ABC} = \frac{1}{2} \det M = \frac{1}{2} m^2 - 6m + 5 $; $m \in [1, 5] \Rightarrow 0 \geq m^2 - 6m + 5 \geq -4$; $A_{ABC} \text{ maximă} = 2$	2p 2p 1p
2. a)	Observăm că $x * y = \frac{1}{5} [(5x+6)(5y+6) - 6]; \forall x, y \in \mathbb{Z}$	1p

	$(x * y) * z = \frac{1}{5}[(5x + 6)(5y + 6)(5z + 6) - 6] = x * (y * z), \forall x, y, z \in \mathbb{Z};$	3p
	$\Leftrightarrow *$ este asociativă	1p
b)	Elementul neutru al operației $*$ este $e = -1 \in \mathbb{Z};$	1p
	$x * x' = e = \frac{1}{5}[(5x + 6)(5x' + 6) - 6] = -1;$	1p
	$\Rightarrow 5x' + 6 = \frac{1}{5x + 6}$	1p
	Cum $x' \in \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{1}{5x + 6} \in \mathbb{Z} \Rightarrow 5x + 6 \in \{-1, 1\};$	1p
	$\Rightarrow 5x \in \{-7, -5\}$. Deci $x = -1$ este simetrizabil și $x' = -1$	1p
c)	Observăm că $x * x = \frac{1}{5}[(5x + 6)^2 - 6]; \forall x \in \mathbb{Z};$	1p
	Inductiv obținem $\underbrace{x * x * \dots * x}_{\text{de 2012 ori}} = \frac{1}{5}[(5x + 6)^{2012} - 6];$	2p
	$\frac{1}{5}[(5x + 6)^{2012} - 6] = -1;$	1p
	$\Leftrightarrow 5x + 6 = 1 \Leftrightarrow x = -1 \in \mathbb{Z}$	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	$f'(x) = (x + 2)e^x, \forall x \in \mathbb{R};$	2p
a)	$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -2;$	1p
	Pe $(-\infty, -2]$ f este strict descrescătoare;	1p
	Pe $[-2, +\infty)$ f este strict crescătoare	1p
b)	$f''(x) = (x + 3)e^x, \forall x \in \mathbb{R};$	1p
	$f''(x) = 0 \Rightarrow x = -3;$	2p
	Pe $(-\infty, -3]$ f este concavă;	2p
	Pe $[-3, +\infty)$ f este convexă	2p
c)	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1)e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1}{e^{-x}} = 0;$	3p
	$y = 0$; AO spre $-\infty$	2p
2.	$F(x) = 3x^2 + 2\ln x + C; \forall x \in [1, +\infty);$	2p
a)	$F(1) = 2012 \Rightarrow C = 2009;$	2p
	$F(x) = 3x^2 + 2\ln x + 2009$	1p
b)	$V = \pi \int_1^2 f^2(x) dx = \pi (12x^3 + 24x - 4x^{-1}) \Big _1^2;$	3p
	$V = 110\pi$	2p
c)	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 6 = m;$	2p
	$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0 = n;$	1p
	$y = 6x$ este asimptota oblică către $+\infty$ a graficului funcției f .	2p