

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 4**

Prof: Andone Emanuel

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$a_{10} = a_1 + 9r = 7 + 27 = 34$ $S_{10} = \frac{(a_1 + a_{10}) \cdot 10}{2} = 205$	3p 2p
2.	<p>O ecuație de gradul al doilea are rădăcini reale distincte dacă și numai dacă $\Delta > 0$</p> $\Delta = 4m^2 + 1$ $4m^2 + 1 > 0$ oricare ar fi m număr real, deoarece reprezintă o sumă de pătrate	1p 2p 2p
3.	$G_f \cap O_y: f(0) = 5^{-2} - 1 = -\frac{24}{25}$ $G_f \cap O_x: \text{rezolvăm ecuația } f(x) = 0 \rightarrow 5^{x-2} = 1 \rightarrow x - 2 = 0 \rightarrow x = 2$ $A(0, -\frac{24}{25}), B(2, 0)$	1p 2p 2p
4.	$P_3 = 3! = 6$ $A_4^2 = \frac{4!}{2!} = 12, A_4^2 - 3P_3 = 12 - 18 = -3$	2p 3p
5.	<p>Doi vectori sunt perpendiculari dacă produsul lor scalar este 0 $\rightarrow 2(5+a) + 2a = 0$</p> $a = -\frac{5}{2}$	2p 3p

6.	$A_{ABC} = \frac{AB \cdot AC \cdot \sin A}{2} \rightarrow$	1p
	$32\sqrt{3} = \frac{8 \cdot 16 \cdot \sin A}{2} \rightarrow \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$	2p
	Măsura unghiului A este egală cu 60° sau 120°	1p
	$\cos A = \frac{1}{2}$ sau $\cos A = -\frac{1}{2}$	1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	O matrice este inversabilă dacă și numai dacă determinantul său este nenul, $\det A = 3a^4 - a^2$	2p
	$\det A = 3a^3 - a^2$ deci $a \in \mathbb{R} - \{0, \frac{1}{3}\}$	2p
	A este inversabilă pentru orice $a \in \mathbb{R} - \{0, \frac{1}{3}\}$	1p
b)	$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -12 \\ 0 & -2 & -18 \\ -6 & 4 & 8 \end{pmatrix}$	3p
	$(A^2)^T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -6 \\ 4 & -2 & 4 \\ -12 & 18 & 8 \end{pmatrix}$	2p
c)	$3A = \begin{pmatrix} 0 & 3a & -3a \\ -9 & 12 & -9a \\ -3a & 3a & 0 \end{pmatrix}$	1p
	$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 - 3a & -a^2 + 4a & -3a^2 \\ 3a^2 - 12 & -3a^2 - 3a + 16 & -9a \\ -3a & -a^2 + 4a & -2a^2 \end{pmatrix}$	2p
	$A^2 - 3A + 2I_3 = \begin{pmatrix} a^2 - 3a + 2 & -a^2 + a & -3a^2 + 3a \\ 3a^2 - 3 & -3a^2 - 3a + 6 & 0 \\ 0 & -a^2 + a & 2 - 2a^2 \end{pmatrix} = O_3$, deci, $a=1$	2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f'(x) = \frac{2-x}{e^x}$ $f(x) + f'(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{e^x} = 1 \rightarrow$ $x=0$	2p 2p 1p
b)	$f'(x) = \frac{2-x}{e^x} = 0 \rightarrow x=2$ <p>Se realizează tabelul de variație al funcției</p> <p>Se precizează semnul primei derivate</p> <p>Pe intervalul $(-\infty, 2)$ f este strict crescătoare și pe intervalul $(2, \infty)$ f este monoton descrescătoare</p>	1p 1p 1p 2p
c)	$f(0) = -1$	1p

	$f'(0) = 2$ ecuația tangentei : $y - f(0) = f'(0)(x - 0)$ $y + 1 = 2x$	1p 1p 2p
2.	$g(x) = (x-1)^3$	2p
a)	$\int g(x) dx = \int (x-1)^3 dx = \frac{(x-1)^4}{4} + C$	2p 1p
b)	$f(x) = x + a + \frac{bx+c}{x^2+x+1} \rightarrow$ $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = x^3 + (a+1)x^2 + x(a+b+1) + a+c \rightarrow$ $a+1 = -3; a+b+1 = 3; a+c = -1 \rightarrow$ $a = -4; b = 6; c = 3$	1p 1p 1p 2p
c)	$\int x - 4 + \frac{3(2x+1)}{x^2+x+1} dx = \frac{x^2}{2} - 4x + 3\ln(x^2+x+1) + C$ $(x^2+x+1)' = 2x+1 \rightarrow$ $\int \frac{(2x+1)}{x^2+x+1} dx = \ln(x^2+x+1) + C$ $\int x - 4 + \frac{3(2x+1)}{x^2+x+1} dx = \frac{x^2}{2} - 4x + 3\ln(x^2+x+1) + C$	2p 1p 2p