

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 40**

Prof: Viorica Lungana

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = 2 \in \mathbb{Z} \\ x_2 = 3 \in \mathbb{Z} \end{matrix}$ <p>Deci mulțimea de adevăr este: $\{2;3\}$</p>	3p 2p
2.	$a_n = a_1 + (n-1)r, n \geq 1$ $a_{10} = a_1 + 9r$ $a_{10} = 131 \text{ și } r = 12 \Rightarrow a_1 + 9 \cdot 12 = 131 \Leftrightarrow a_1 = 131 - 108 \Leftrightarrow a_1 = 32$	1p 2p 2p
3.	$\lg 288 = \lg(2^5 \cdot 3^2) =$ $= \lg 2^5 + \lg 3^2 =$ $= 5 \lg 2 + 2 \lg 3 = 5A + 2B$	1p 2p 2p
4.	$n-2 \geq 0 \Rightarrow n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ $\frac{n!}{(n-2)!} = 2 \Leftrightarrow \frac{(n-2)!(n-1)n}{(n-2)!} = 2 \Leftrightarrow n(n-1) = 2$ $n^2 - n - 2 = 0 \Rightarrow n_1 = 2 \in \mathbb{N}, n_2 = -1 \notin \mathbb{N}.$ <p>Deci $n = 2$</p>	2p 3p
5.	$\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} = (x_C - x_A)\vec{i} + (y_C - y_A)\vec{j} - 2[(x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}] =$ $= 10\vec{i} + \vec{j} - 2(3\vec{i} - 3\vec{j}) = 4\vec{i} + 7\vec{j}$	2p 3p

6.	$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}, \quad (1)$	2p
	$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}, \quad (2)$	2p
	<p>Din relațiile (1) și (2) rezultă $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$.</p>	1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\begin{cases} 2X + 3Y = A \\ X + 2Y = B \end{cases} \cdot (-2) \Rightarrow \begin{cases} 2X + 3Y = A \\ -2X - 4Y = -2B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = B - 2Y \\ Y = 2B - A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = 2A - 3B \\ Y = 2B - A \end{cases}$	2p
	$X = 2A - 3B = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ 4 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix} +$ $+ \begin{pmatrix} -3 & -6 & -3 \\ -6 & -3 & -6 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -5 \\ -2 & -5 & -2 \\ -5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$	2p
b)	$Y = 2B - A = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$ $= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$	1p
	$X + Y = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -5 \\ -2 & -5 & -2 \\ -5 & -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	3p
	$A - B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$	2p

	$= \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ <p>Deci $X + Y = A - B$</p>	
c)	$\det(X + Y) = \begin{vmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} =$ $= 8 \in \mathbf{N}$	<p>3p</p> <p>2p</p>
2.	$x * y = xy - 5x - 5y + 30 = (x - 5)(y - 5) + 5, (\forall) x, y \in G$	1p
a)	<p>Legea este asociativă dacă $(x * y) * z = x * (y * z), (\forall) x, y, z \in G$</p> $(x * y) * z = (x * y - 5)(z - 5) + 5 = [(x - 5)(y - 5) + 5 - 5](z - 5) + 5 =$ $= (x - 5)(y - 5)(z - 5) + 5, (\forall) x, y, z \in G, (1)$ $x * (y * z) = (x - 5)(y * z - 5) + 5 = (x - 5)[(y - 5)(z - 5) + 5 - 5] + 5 =$ $= (x - 5)(y - 5)(z - 5) + 5, (\forall) x, y, z \in G, (2)$ <p>Din relațiile (1) și (2), rezultă legea este asociativă.</p>	<p>2p</p> <p>2p</p>
b)	<p>Legea are element neutru dacă există $e \in G$ astfel încât $x * e = e * x = x, (\forall) x \in G$.</p> $x * e = x, (\forall) x \in G \Leftrightarrow (x - 5)(e - 5) + 5 = x, (\forall) x \in G \Leftrightarrow (x - 5)(e - 6) = 0, (\forall) x \in G \Rightarrow$ $\Rightarrow e = 6 \in (5, \infty), (\forall) x \in G.$ <p>Oricare ar fi $x \in G$ există $x' \in G$ astfel încât $x * x' = x' * x = 6$.</p> $x * x' = 6, (\forall) x \in G \Leftrightarrow (x - 5)(x' - 5) + 5 = 6, (\forall) x \in G \Leftrightarrow x' - 5 = \frac{1}{x - 5}, (\forall) x \in G \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow x' = 5 + \frac{1}{x - 5} > 5, (\forall) x \in (5, \infty).$ <p>Deci orice element din mulțimea G este inversabil.</p>	<p>3p</p> <p>2p</p>
c)	<p>Din asociativitatea legii, dacă $x = y = z$, atunci $x * x * x = 6 \Leftrightarrow (x - 5)^3 + 5 = 6 \Leftrightarrow$</p>	2p

$\Leftrightarrow (x-5)^3 = 1 \Rightarrow x-5 = 1 \Rightarrow x = 6 \in (5, \infty)$	3p
---	----

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	$1-x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1 \Rightarrow$	2p																								
a)	$D = \mathbb{R} - \{1\}$	3p																								
b)	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$ $f'(x) = \frac{1-x-1-x}{(1-x)^2} = -\frac{2x}{(1-x)^2}$ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{2x}{(1-x)^2} = 0 \Rightarrow x = 0$ $f''(x) = -2 \cdot \frac{(1-x)^2 + 2(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{-2(1-x)(1-x+2)}{(1-x)^4} = \frac{2(x-3)}{(1-x)^3}$ $f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2(x-3)}{(1-x)^3} = 0 \Rightarrow x = 3$ <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td colspan="5">+ + + + + 0 - - - - -</td></tr><tr><td>$f''(x)$</td><td colspan="5">- - - - - 0 + + + + +</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="5"><div><div><div>$\nearrow$</div><div>$\searrow$</div></div><div>$\frac{1}{(M)}$</div><div><div>$\searrow$</div><div>$\nearrow$</div></div><div>$-\frac{2}{(I)}$</div><div>$\nearrow$</div></div></td></tr></table> <p>$x = 0$ punct de maxim</p> <p>$x = 3$ punct de inflexiune</p>	x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$	$f'(x)$	+ + + + + 0 - - - - -					$f''(x)$	- - - - - 0 + + + + +					$f(x)$	<div><div><div>$\nearrow$</div><div>$\searrow$</div></div><div>$\frac{1}{(M)}$</div><div><div>$\searrow$</div><div>$\nearrow$</div></div><div>$-\frac{2}{(I)}$</div><div>$\nearrow$</div></div>					1p 1p 1p 2p
x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$																					
$f'(x)$	+ + + + + 0 - - - - -																									
$f''(x)$	- - - - - 0 + + + + +																									
$f(x)$	<div><div><div>$\nearrow$</div><div>$\searrow$</div></div><div>$\frac{1}{(M)}$</div><div><div>$\searrow$</div><div>$\nearrow$</div></div><div>$-\frac{2}{(I)}$</div><div>$\nearrow$</div></div>																									
c)	Ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul $M(x_0, y_0)$ este $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ $f(2) = -3$ $f'(2) = -\frac{4}{1} = -4$	1p 1p 1p																								

	$y + 3 = -4(x - 2) \Leftrightarrow 4x + y - 5 = 0$	2p
2. a)	$I_1 = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx =$ $= \frac{1}{2} \cdot \ln(x^2 + 1) \Big _0^1 =$ $= \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1) = \frac{\ln 2}{2}$	2p 2p 1p
b)	$\frac{x^2}{x^2 + 1} - \frac{x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - x}{x^2 + 1} \leq 0, (\forall) x \in [0, 1], \text{ atunci}$ $I_2 - I_1 = \int_0^1 \left(\frac{x^2 - x}{x^2 + 1} \right) dx \leq 0 \Leftrightarrow I_2 \leq I_1$	2p 3p
c)	$I_{n+2} + I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+2}}{x^2 + 1} dx + \int_0^1 \frac{x^n}{x^2 + 1} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx =$ $= \int_0^1 x^n dx =$ $= \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big _0^1 = \frac{1}{n+1}, (\forall) n \in \mathbb{N}^*.$	2p 1p 2p