

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 53**

Prof: Oláh Csaba.

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	Se cunoaște formula $C_n^k = C_n^{n-k} \Rightarrow$ $\Rightarrow C_{16}^7 = C_{16}^9$ și $C_{16}^{12} = C_{16}^4 \Rightarrow$ $\Rightarrow a - b = C_{16}^7 - C_{16}^9 + C_{16}^{12} - C_{16}^4 = 0.$	1p 2p 2p
2.	$\Delta = (2m+3)^2 - 12m = 4m^2 + 9$ $\min_{x \in R} f(x) = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{4m^2 + 9}{4m}, \min_{x \in R} f(x) = -3 \Rightarrow$ $\Rightarrow \frac{4m^2 + 9}{4m} = 3 \Rightarrow 4m^2 - 12m + 9 = 0 \Rightarrow (2m-3)^2 = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow m = \frac{3}{2}.$	1p 2p 2p
3.	$x > 1, \sqrt{2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$, trecem în baza $\sqrt{2} + 1$ $\log_{\sqrt{2}+1}(x+1) + \frac{\log_{\sqrt{2}+1}(x-1)}{\log_{\sqrt{2}+1}(\sqrt{2}-1)} = 1 \Leftrightarrow \log_{\sqrt{2}+1}(x+1) - \log_{\sqrt{2}+1}(x-1) = 1$ $\log_{\sqrt{2}+1} \frac{x+1}{x-1} = \log_{\sqrt{2}+1}(\sqrt{2}+1)$, deci $\frac{x+1}{x-1} = \sqrt{2} + 1$ $x+1 = \sqrt{2}x + x - \sqrt{2} - 1 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}} = \frac{2+2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} + 1 > 1.$	1p 2p 2p

4.	$b_3 = b_1 q^2, b_7 = b_1 q^6 \Rightarrow \frac{54}{6} = \frac{b_7}{b_3} = q^4 \Rightarrow q^4 = 9 \Rightarrow q = \pm\sqrt{3}$ $b_1 = \frac{b_3}{q^2} = \frac{6}{3} = 2.$	3p 2p
5.	$d: 2x - y + 4 = 0, y = 2x + 4 \Rightarrow m_d = 2$ $d_1: y - 2 = m_{d_1}(x - 1), m_d \cdot m_{d_1} = -1 \Rightarrow m_{d_1} = \frac{-1}{m_d} = -\frac{1}{2}$ $d_1: y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Leftrightarrow x + 2y - 5 = 0.$	1p 1p 3p
6.	$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} \text{ (teorema sinusurilor)} \Rightarrow BC = \frac{AC \cdot \sin A}{\sin B} =$ $= \frac{10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{10\sqrt{6}}{3}.$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -a \\ 0 & 1 & 5 \\ a & 1 & 0 \end{vmatrix} = a^2 + 10a - 5, a^2 + 10a - 5 = 0 \Rightarrow x \in \{-5 - \sqrt{30}, -5 + \sqrt{30}\}$ $A \text{ este inversabilă} \Rightarrow a \in \mathbb{R} \setminus \{-5 - \sqrt{30}, -5 + \sqrt{30}\}.$	3p 2p
b)	$a = 1, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ calculând } A^*, \text{ se obține}$ $A^* = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 11 \\ 5 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ de unde } A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A^* = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -5 & -1 & 11 \\ 5 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$	1p 4p
c)	$A \cdot X = B \Rightarrow$	1p

	$\Rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -5 & -1 & 11 \\ 5 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -10 & -1 & 22 \\ 10 & 1 & -10 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$	4p
2.	Utilizând relațiile lui Viète $x_1 + x_2 + x_3 = -1$, $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = 1$, atunci	1p
a)	$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1) = (-1)^2 - 2 \cdot 1 =$ $= -1 < 0$ rezultă că f nu are toate rădăcinile reale.	2p 2p
b)	Se poate observa ușor că $f(1) = 0 \Rightarrow x = 1$ este o rădăcină reală a polinomului.	5p
c)	Rădăcinile polinomului satisfac ecuația $f(x) = 0$. $x_1^3 + x_1^2 + x_1 - 3 = 0$ $x_2^3 + x_2^2 + x_2 - 3 = 0$ $x_3^3 + x_3^2 + x_3 - 3 = 0$, adunând cele trei relații, obținem $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \underbrace{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}_{=-1} + \underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{=-1} - 9 = 0$, de unde $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 11.$	1p 2p 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2} = 1 - \frac{1}{x^2}.$	5p
b)	$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)' = \frac{2}{x^3} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) < 0, \text{ dacă } x < 0 \\ f'(x) > 0 \text{ dacă } x > 0 \end{cases} \Rightarrow$ $\Rightarrow f \text{ e descrescătoare, dacă } x < 0 \text{ și e crescătoare dacă } x > 0.$	3p 2p
c)	$f(k) = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k \cdot k}$	1p

	$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(2) \cdot f(3) \cdot \dots \cdot f(n)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \dots \cdot (n-1)(n+1)}{2 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \dots \cdot n} =$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}.$	2p
2.	$F'(x) = f(x) = 2^x + x^2 > 0 \Rightarrow$	3p
a)	$\Rightarrow F \text{ este o funcție crescătoare.}$	2p
b)	$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 (2^x + x^2) dx = \left(\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^3}{3} \right) \Big _1^2 = \frac{4}{\ln 2} + \frac{8}{3} - \frac{2}{\ln 2} - \frac{1}{3} =$ $= \frac{2}{\ln 2} + \frac{7}{3}.$	3p
c)	$\int_1^2 (f(x) + f(2x)) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_1^2 f(2x) dx$ $\int_1^2 f(2x) dx = \int_1^2 (4^x + 4x^2) dx = \left(\frac{4^x}{\ln 4} + \frac{4x^3}{3} \right) \Big _1^2 =$ $= \frac{16}{\ln 4} + \frac{4 \cdot 8}{3} - \frac{4}{\ln 4} - \frac{4 \cdot 1}{3} = \frac{12}{\ln 4} + \frac{28}{3},$ <p>Din b) $\int_1^2 f(x) dx = \frac{2}{\ln 2} + \frac{7}{3}$, atunci</p> $\int_1^2 (f(x) + f(2x)) dx = \frac{2}{\ln 2} + \frac{7}{3} + \frac{12}{\ln 4} + \frac{28}{3} = \frac{2}{\ln 2} + \frac{12}{\ln 4} + \frac{35}{3}.$	3p
		2p