

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 54**

Prof: Opreță Elena

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	Aplică formula $a_n = a_1 + (n-1)r$ pentru $n = 4 : a_4 = a_1 + 3r$ Obține $a_4 = 11$	3p 2p
2.	Pune condiția $\Delta = 0$ Calculează $\Delta = 16 - 4m$ Obține $m = 4$	1p 2p 2p
3.	Scrie forma echivalentă $3^{6x-12} = 3^6$ Folosește injectivitatea funcției exponențiale și ajunge la ecuația $6x - 12 = 6$ Finalizare $x = 3$	1p 2p 2p
4.	Cantitatea de magneziu este $2^0 /_{00} \cdot 2,5$ Obține 5g de magneziu	2p 3p
5.	Lungimea segmentului $AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$ $AB = \sqrt{(1-2)^2 + (3-1)^2}$ $AB = \sqrt{5}$	2p 2p 1p

6.	Aria triunghiului ABC este $A_{\triangle ABC} = \frac{AC \cdot AB \cdot \sin(\angle ABC)}{2}$	2p
	$A_{\triangle ABC} = \frac{3 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ}{2}$	1p
	Finalizare $A_{\triangle ABC} = \frac{15}{4}$	2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	Pentru $x=1$ și $y=0$ se obține $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$	2p
	Pentru $x=y=0$ se obține $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in G$	2p
	Finalizare	1p
b)	Fie $A = \begin{pmatrix} x & y \\ 5x & y \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} t & z \\ 5z & t \end{pmatrix}, x, y, t, z \in R$	1p
	$A+B = \begin{pmatrix} x+t & y+z \\ 5(y+z) & x+t \end{pmatrix} \in G$	2p
	$A \cdot B = \begin{pmatrix} xt+5yz & xz+yt \\ 5(xz+yt) & xt+5yz \end{pmatrix} \in G$	2p
c)	A inversabilă dacă $\det(A) \neq 0$.	1p
	$\det(A) = x^2 - 5y^2 \neq 0$ deci $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$	1p
	Calculează $A^* = \begin{pmatrix} x & -y \\ -5y & x \end{pmatrix}$	1p
	Scrie $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{x}{x^2-5y^2} & -\frac{y}{x^2-5y^2} \\ -\frac{5y}{x^2-5y^2} & \frac{x}{x^2-5y^2} \end{pmatrix}$	2p

2.	Scrie $x \circ y = 4xy + 4x + 4y + 4 - 1$	1p
a)	$x \circ y = 4(xy + x + y + 1) - 1 =$ $= 4[x(y+1) + (y+1)] - 1 =$ $= 4(x+1)(y+1) - 1$	3p
	Finalizare	1p
b)	<p>Legea "o" asociativă dacă $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z) \quad \forall x, y, z \in R$. Calculează</p> $(x \circ y) \circ z = (4xy + 4x + 4y + 3) \circ z = \dots = 16xyz + 16xy + 16xz + 16yz + 16x + 16y + 16z + 15$ <p>Calculează</p> $x \circ (y \circ z) = x \circ (4yz + 4y + 4z + 3) = \dots = 16xyz + 16xy + 16xz + 16yz + 16x + 16y + 16z + 15.$	3p
c)	<p>Demonstrează că $\underbrace{x \circ x \circ \dots \circ x}_{\text{de } n \text{ ori}} = 4^{n-1}(x+1)^n - 1$</p> <p>Scrie ecuația $\underbrace{x \circ x \circ \dots \circ x}_{\text{de } 2012 \text{ ori}} = -1$ sub forma $4^{2011}(x+1)^{2012} - 1 = -1$ care este echivalentă cu</p> $4^{2011}(x+1)^{2012} = 0$ <p>Obține soluția $x = -1$</p>	2p
		2p
		1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	Calculează $f(1) = 1 + a$	2p
a)	Scrie ecuația $f(1) = 2$ sub forma $1 + a = 2$	2p
	Obține $a = 1$	1p
b)	<p>Observă că $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$</p> <p>Calculează $f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'x - (x^2 + 1)x'}{x^2}$</p> <p>Obține $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$</p>	1p
		1p
		1p

	Calculează $f'(1) = 0$ și deduce că $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = 0$	2p
c)	<p>f este strict crescătoare pe $[\sqrt{a}, +\infty)$ dacă $f'(x) > 0 \forall x \in [\sqrt{a}, +\infty)$.</p> <p>Calculează $f'(x) = \frac{x^2 - a}{x^2}$</p> <p>Observă că pentru $x > \sqrt{a} \Rightarrow x^2 > a \Rightarrow x^2 - a > 0, x^2 > 0$</p> <p>Rezultă că $f'(x) > 0 \forall x \in [\sqrt{a}, +\infty)$ ceea ce implică f este strict crescătoare pe $[\sqrt{a}, +\infty)$</p>	<p>1p</p> <p>1p</p> <p>1p</p> <p>2p</p>
2. a)	<p>Pentru a calcula $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x e^x dx$ aplicăm metoda de integrare prin părți.</p> $\int_0^1 x(e^x)' dx = x e^x \Big _0^1 - \int_0^1 e^x (x)' dx = e - \int_0^1 e^x dx$ <p>Obține $\int_0^1 x e^x dx = 1$</p>	<p>2p</p> <p>2p</p> <p>1p</p>
b)	<p>Calculează $f(x)g'(x) = 2x^2 e^x$</p> $\int_0^1 2x^2 e^x dx = 2 \int_0^1 x^2 (e^x)' dx =$ $= 2x^2 e^x \Big _0^1 - 2 \int_0^1 (x^2)' e^x dx =$ $= 2e - 4 \int_0^1 x e^x dx = 2e - 4$	<p>1p</p> <p>1p</p> <p>1p</p> <p>2p</p>
c)	<p>Calculează $h(x) = f(x) + g(x) = x e^x + x^2 + 2$</p> $A = \int_0^1 h(x) dx$ <p>Scrive formula pentru arie $A = \int_0^1 (x e^x + x^2 + 2) dx = \int_0^1 x e^x dx + \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 2 dx$</p> $A = \frac{10}{3}$	<p>2p</p> <p>1p</p> <p>2p</p>