

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 61**

Prof: PODUMNEACĂ DANIELA

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$\sqrt[3]{2 \cdot 32} - 1 = \sqrt[3]{64} - 1 =$ $= 4 - 1 = 3$	3p 2p
2.	$f(3^0) = 2 + 3^0; f(3^1) = 2 + 3^1; f(3^2) = 2 + 3^2; \dots; f(3^{10}) = 2 + 3^{10}$ Suma lor este $11 \cdot 2 + 3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{10} = 11 \cdot 2 + 1 \cdot \frac{3^{11} - 1}{3 - 1} = \dots$ $= \frac{3^{11} + 43}{2}$	1p 2p 2p
3.	$x + 3 \geq 0, 5 - x \geq 0 \Rightarrow x \in [-3; 5]$ Ecuația echivalentă $x + 3 = (5 - x)^2 \Leftrightarrow x^2 + 11x + 22 = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow x_1 = \frac{11 - \sqrt{33}}{2} \in [-3; 5] \text{ și } \Rightarrow x_1 = \frac{11 + \sqrt{33}}{2} \notin [-3; 5], \text{ soluția } S = \left\{ \frac{11 - \sqrt{33}}{2} \right\}.$	1p 2p 2p
4.	$P_5 = 5! =$ $= 720$	2p 3p
5.	$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QM} = \vec{0}$ Cum $\overrightarrow{NP} = -\overrightarrow{PN}$ și $\overrightarrow{QM} = -\overrightarrow{MQ}$, atunci $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{MQ} = \vec{0}$	2p 2p 1p

6.	$\sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} =$	3p
	$= \frac{\sqrt{6}}{4}$	2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\Delta(1, -1) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} =$ $= 3 - 2 + 9 = 10$	2p 3p
b)	$\Delta(x, y) = \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = x - 9y + 3.$ <p>Atunci $\begin{cases} x + y = -6 \\ x - 9y + 3 = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = -1 \end{cases}$</p>	2p 3p
c)	$\Delta(x, y) = x - 9y + 3 \Rightarrow \Delta(x, x) = -8x + 3$ $\Delta(x, x) = 0 \Rightarrow -8x + 3 = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow x = \frac{3}{8} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \Delta(x, x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{Z}$	1p 2p 2p
2. a)	$f: (x-2) \Leftrightarrow f(2) = 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow -a + 2 = 0 \Rightarrow a = 2 \in \mathbb{R}$	3p 2p
b)	<p>Relația este $3S_3 - 2S_1 = 3 \Leftrightarrow$</p> <p>$S_1 = a; S_3 = -(a-6)$, atunci</p> <p>Relația devine $-5a + 18 = 3 \Rightarrow a = 3$</p>	1p 2p 2p
c)	<p>Dacă $a = 6$ atunci polinomul este de forma $f = X^3 + 6X^2 + 6X =$</p> <p>$= X(X^2 + 6X + 6) =$</p> <p>$= X(X - 3 + \sqrt{3})(X + 3 - \sqrt{3})$</p>	1p 2p 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	Funcția admite asimptote verticale în punctele $x = 0$ și $x = 2$.	1p
a)	$\lim_{x \nearrow 0} f(x) = +\infty, \lim_{x \searrow 0} f(x) = -\infty \Rightarrow x = 0$	2p
	$\lim_{x \nearrow 2} f(x) = -\infty, \lim_{x \searrow 2} f(x) = +\infty \Rightarrow x = 2$	2p
b)	$f'(x) = \frac{-2(x^2 + x - 1)}{(x^2 - 2x)},$	2p
	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) =$	2p
	$= -2$	1p
c)	$f'(x) = 0 \Leftrightarrow$	2p
	$\Leftrightarrow x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow$	1p
	$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \neq 0; \neq 2$	2p
2.	$A = \int_1^2 f(x) dx =$	2p
a)	$= \left(x - \frac{x^4}{4} \right) \Big _1^2 =$	2p
	$= \frac{-13}{4}$	1p
b)	$\int_{-1}^1 x^5 \cdot f(x) dx = \int_{-1}^1 (x^5 - x^8) dx =$	2p
	$= \left(\frac{x^6}{6} - \frac{x^9}{9} \right) \Big _{-1}^1 =$	2p
	$= -\frac{2}{9}$	1p
c)	$\int_0^1 x \cdot f''(x) dx = \int_0^1 x \cdot (-6x) dx =$	2p
	$= -6 \int_0^1 x^2 dx =$	2p
	$= -2$	1p