

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 63**

Prof: PODUMNEACĂ DANIELA

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$\log_n 32 = a \in \mathbb{N} \Rightarrow 32 = n^a \Rightarrow$ $\Rightarrow n = 2, n = 32$	3p 2p
2.	$f_{\max} = \frac{-\Delta}{4a} \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow \frac{1}{8} = \frac{9+8a}{8} \Rightarrow$ $\Rightarrow a = -1$	1p 2p 2p
3.	$\left(\frac{3}{5}\right)^{x-2} = \left(\frac{3}{5}\right)^{2(3-x)} \Rightarrow$ $\Rightarrow x-2 = 2(3-x) \Rightarrow$ $\Rightarrow x = \frac{8}{3}$	1p 2p 2p
4.	$x + 12\% x = 3920 \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow x \cdot \frac{28}{25} = 3920 \Rightarrow x = 3500$	2p 3p
5.	$\frac{l^2}{A_z} = \frac{l^2}{l^2 \frac{\sqrt{3}}{4}} =$ $= \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$	3p 2p
6.	Din teorema cosinusului $\Rightarrow \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} =$	3p

	$= \frac{16+8-27}{2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{32}$	2p
--	--	----

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.		1p
a)	$\det A = \begin{vmatrix} 2x - \sqrt{3} & 2x \\ 2x & 2x + \sqrt{3} \end{vmatrix} =$ $(2x - \sqrt{3})(2x + \sqrt{3}) - 4x^2 =$ $= 4x^2 - 3 - 4x^2 = -3$	2p 2p
b)	$A(x) \cdot A(x) = \begin{pmatrix} 8x^2 - 4\sqrt{3}x + 3 & 8x^2 \\ 8x^2 & 8x^2 + 4\sqrt{3}x + 3 \end{pmatrix}, (1)$ $4x \cdot A(x) + 3I_2 = \begin{pmatrix} 8x^2 - 4\sqrt{3}x & 8x^2 \\ 8x^2 & 8x^2 + 4\sqrt{3}x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, (2)$ <p>Din calcul direct (1) = (2)</p>	2p 2p 1p
c)	$A^2(x) \stackrel{(b)}{=} 4x \cdot A(x) + 3I_2$ $A^2(2) - 8 \cdot A(2) = 8 \cdot A(2) + 3I_2 - 8 \cdot A(2) =$ $= 3I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$	1p 2p 2p
2.	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z), \forall x, y, z \in \mathbb{R}$	1p
a)	$(x \circ y) \circ z = (x + y - 4) \circ z = x + y + z - 8 = x \circ (y + z - 4) = x \circ (y \circ z)$ <p>Legea "o" este asociativă $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$.</p>	3p 1p
b)	$(2 \perp 3) \circ (4 \perp 5) = (12) \circ (30) - 4 =$ $= 12 + 30 - 4 = 38$	3p 2p
c)	<p>Ecuatie echivalentă cu $(x^2 + 2x + 1) \circ (3 - 2x) = 5 \Leftrightarrow$</p> $\Leftrightarrow x^2 = 5 \Rightarrow$ $\Rightarrow x = \pm\sqrt{5}$	2p 2p 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$x^2 - 4x + 5a = \text{pătrat perfect dacă } a = \frac{4}{5}$ Atunci $f(x) = \frac{x-5}{(x-2)^2} \Rightarrow f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow f$ are o singură asimptotă.	3p 2p
b)	Funcția devine $f(x) = \frac{x-5}{(x-2)^2}, f: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ $f'(x) = \frac{-(x-8)}{(x-2)^3}$	2p 3p
c)	Conform (b) $f'(x) < 0, \forall x \in (8, \infty) \Rightarrow$ $\Rightarrow f$ descrescătoare pe intervalul $(8, \infty)$	3p 2p
2. a)	Funcția f este o primitivă a funcției g dacă $f'(x) = g(x)$ $f'(x) = (\sqrt{2x-7})' = \frac{(2x-7)'}{2\sqrt{2x-7}} = \frac{1}{\sqrt{2x-7}} = g(x)$	2p 3p
b)	$\int_4^5 g(x)dx = f(x) _4^5 =$ $= f(5) - f(4) = \sqrt{3} - 1$	3p 2p
c)	$V = \pi \int_4^6 h^2(x)dx = \pi \int_4^6 (\sqrt{2x-7})^2 dx =$ $= \pi \int_4^6 (2x-7) dx =$ $= \pi \left(\frac{2x^2}{2} - 7x \right) \Big _4^6 = 6\pi$	2p 1p 2p