

	$\begin{cases} 2x-5 > 0 \\ x^2-8 > 0 \\ \log_2(x^2-8) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (\frac{5}{2}; +\infty) \\ x \in (-\infty; -2\sqrt{2}) \cup (2\sqrt{2}; +\infty) \Rightarrow D = (2\sqrt{2}; +\infty) - \{10\} \\ x \neq \pm 10 \end{cases}$	2p
	<p>Ec.devine $2\log_2(2x-5) = \log_2(x^2-8) \Leftrightarrow \log_2(2x-5)^2 = \log_2(x^2-8) \Leftrightarrow (2x-5)^2 = x^2-8$</p> <p>$\Rightarrow 3x^2 - 20x + 33 = 0 \Rightarrow x_1 = 3 \in D$ si $x_2 = \frac{11}{3} \in D$</p>	2p
4.	$(1+i)^4 = (1+i)^2 \cdot (1+i)^2 = (1+2i+i^2)(1+2i+i^2) =$ $= 2i \cdot 2i = 4i^2 = -4$ $\operatorname{Re}((1+i)^4) = -4$	3p 2p
5.	$C_{12}^3 = C_{12}^9 \left(\text{combinari complementare} \right)$ <p>Finalizare: $C_{12}^3 - C_{12}^9 = 0$</p>	3p 2p
6.	<p>Notăm cu h înălțimea dusă din A pe latura BC $\Rightarrow m_h \cdot m_{BC} = -1$</p> $m_{BC} = \frac{y_B - y_C}{x_B - x_C} = \frac{3+2}{-4-6} = \frac{5}{-10} = -\frac{1}{2} \Rightarrow m_h \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \Rightarrow m_h = 2$ $y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 6 = 2(x - 2)$	1p 2p 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	<p>Fie $A = \begin{pmatrix} \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{2} \cdot \hat{b} & \hat{a} \end{pmatrix} \in M, \hat{a}, \hat{b} \in \mathbb{Z}_5$; luam $\hat{a} = \hat{1}$ si $\hat{b} = \hat{0} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} = I_2$</p>	2p
----------	---	----

	<p>Daca luam $\hat{a} = \hat{b} = \hat{0} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix} = O_2$</p> <p>$\Rightarrow I_2, O_2 \in M.$</p>	<p>2p</p> <p>1p</p>
b)	<p>Fie $A = \begin{pmatrix} \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{2} \cdot \hat{b} & \hat{a} \end{pmatrix} \in M, \hat{a}, \hat{b} \in \mathbb{Z}_5$ si $B = \begin{pmatrix} \hat{c} & \hat{d} \\ \hat{2} \cdot \hat{d} & \hat{c} \end{pmatrix} \in M; \hat{c}, \hat{d} \in \mathbb{Z}_5$</p> <p>$A + B = \begin{pmatrix} \hat{a} + \hat{c} & \hat{b} + \hat{d} \\ \hat{2} \cdot \hat{b} + \hat{2} \cdot \hat{d} & \hat{a} + \hat{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{a} + \hat{c} & \hat{b} + \hat{d} \\ \hat{2} \cdot (\hat{b} + \hat{d}) & \hat{a} + \hat{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{m} & \hat{n} \\ \hat{2} \cdot \hat{n} & \hat{m} \end{pmatrix} \in M, \text{ unde } \hat{m} = \hat{a} + \hat{c} \in \mathbb{Z}_5 \text{ si}$</p> <p>$\hat{n} = \hat{b} + \hat{d} \in \mathbb{Z}_5$</p> <p>$A \cdot B = \begin{pmatrix} \hat{a}\hat{c} + \hat{2}\hat{b}\hat{d} & \hat{a}\hat{d} + \hat{b}\hat{c} \\ \hat{2}\hat{b}\hat{c} + \hat{2}\hat{a}\hat{d} & \hat{a}\hat{c} + \hat{2}\hat{b}\hat{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{a}\hat{c} + \hat{2}\hat{b}\hat{d} & \hat{a}\hat{d} + \hat{b}\hat{c} \\ \hat{2} \cdot (\hat{a}\hat{d} + \hat{b}\hat{c}) & \hat{a}\hat{c} + \hat{2}\hat{b}\hat{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{p} & \hat{q} \\ \hat{2} \cdot \hat{q} & \hat{p} \end{pmatrix} \in M, \text{ unde}$</p> <p>$\hat{p} = \hat{a}\hat{c} + \hat{2}\hat{b}\hat{d} \in \mathbb{Z}_5$ si $\hat{q} = \hat{a}\hat{d} + \hat{b}\hat{c} \in \mathbb{Z}_5$</p>	<p>2p</p> <p>3p</p>
c)	<p>$A \in M$ este inversabilă $\Leftrightarrow \det(A) \neq \hat{0}$</p> <p>$\hat{a}^2 - \hat{2}\hat{b}^2 \neq \hat{0} \Leftrightarrow \hat{a}^2 \neq \hat{2}\hat{b}^2$</p> <p>Pentru $\hat{a} = \hat{0} \Rightarrow \hat{2}\hat{b}^2 \neq \hat{0} \Rightarrow \hat{b} \in \{1, 2, 3, 4\} \Rightarrow$ se construiesc 4 matrice inversabile</p> <p>Pentru $\hat{a} = \hat{1} \Rightarrow \hat{2}\hat{b}^2 \neq \hat{1} \Rightarrow \hat{b} \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \Rightarrow$ se construiesc 5 matrice inversabile</p> <p>Pentru $\hat{a} = \hat{2} \Rightarrow \hat{2}\hat{b}^2 \neq \hat{2} \Rightarrow \hat{2}\hat{b}^2 \neq \hat{4} \Rightarrow \hat{b} \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \Rightarrow$ se construiesc 5 matrice inversabile</p>	<p>1p</p> <p>2p</p>

	<p>Pentru $\hat{a} = 3 \Rightarrow \hat{2b} \neq 3 \Rightarrow \hat{2b} \neq 4 \Rightarrow \hat{b} \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \Rightarrow$ se construiesc 5 matrice inversabile</p> <p>Pentru $\hat{a} = 4 \Rightarrow \hat{2b} \neq 4 \Rightarrow \hat{2b} \neq 1 \Rightarrow \hat{b} \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \Rightarrow$ se construiesc 5 matrice inversabile</p> <p>Deci mulțimea $U(M) = \{A \in M \mid \text{există } A^{-1} \in M\}$ are 24 elemente</p>	2p
2.	$\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = X^4 - X^2 + \frac{1}{4} + X^2 + X + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} =$	4p
a)	$= X^4 + X + 1 = f$	1p
b)	<p>x_1 rădăcină a polin.$f \Rightarrow f(x_1) = 0 \Rightarrow x_1^4 + x_1 + 1 = 0(1)$</p> <p>$x_2$ rădăcină a polin.$f \Rightarrow f(x_2) = 0 \Rightarrow x_2^4 + x_2 + 1 = 0(2)$</p> <p>$x_3$ rădăcină a polin.$f \Rightarrow f(x_3) = 0 \Rightarrow x_3^4 + x_3 + 1 = 0(3)$</p> <p>$x_4$ rădăcină a polin.$f \Rightarrow f(x_4) = 0 \Rightarrow x_4^4 + x_4 + 1 = 0(4)$</p> <p>Însumând cele 4 relații $\Rightarrow (x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4) + (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) + 4 = 0$, dar cf. rel. Viete știm că</p> <p>$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = -4$</p>	3p 1p 1p
c)	<p>Conform pct. a) $f = \underbrace{\left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2}_{\geq 0} + \frac{1}{2} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$</p> <p>Polinomul f nu admite rădăcini reale.</p>	3p 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$; f este continuă pe $\mathbb{R}$, derivabilă pe $\mathbb{R}$ și $f'(x) = e^x - 1$	2p												
a)	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td colspan="3">-----0+++++</td></tr><tr><td>f(x)</td><td>$+\infty$</td><td>$\searrow \searrow \searrow \searrow \searrow$</td><td>$\nearrow \nearrow \nearrow \nearrow \nearrow$</td></tr></table> <p>finalizare</p>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$f'(x)$	-----0+++++			f(x)	$+\infty$	$\searrow \searrow \searrow \searrow \searrow$	$\nearrow \nearrow \nearrow \nearrow \nearrow$	2p 1p
x	$-\infty$	0	$+\infty$											
$f'(x)$	-----0+++++													
f(x)	$+\infty$	$\searrow \searrow \searrow \searrow \searrow$	$\nearrow \nearrow \nearrow \nearrow \nearrow$											
b)	Din tabelul de la punctul a) se observă că f are un minim global egal cu 0 atins pentru $x=0$ $\Rightarrow f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$	3p 2p												
c)	Din b) $\Rightarrow f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow e^x \geq x+1, \forall x \in \mathbb{R} \quad (1)$; Cf. rel. (1) $\Rightarrow e^{x^2} \geq x^2 + 1, \forall x \in [0;1] \Rightarrow \frac{1}{x^2 + 1} \geq \frac{1}{e^{x^2}} = e^{-x^2} \quad (2)$ Deoarece $x \in [0;1] \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 1 \Rightarrow x-1 \leq 0 / \cdot (x+1) > 0 \Rightarrow$ $x^2 - 1 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 / \cdot (-1) \Rightarrow -x^2 \geq -1$ $\Rightarrow e^{-1} \leq e^{-x^2} \quad (3)$; Din (2) si (3) $\Rightarrow e^{-1} \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1}$ (prin integrare) $\Rightarrow \int_0^1 e^{-1} dx \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx \Rightarrow$ $\frac{1}{e} \cdot x \Big _0^1 \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq \arctg x \Big _0^1 \Rightarrow \frac{1}{e} \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq \frac{\pi}{4}$	2p 2p 1p												
2.	Funcția f are minim ($a=1>0$) și $V_f\left(\frac{a}{2}; -\frac{a}{4}\right)$ Funcția g are maxim ($a=-1<0$) și $V_g\left(\frac{3a}{2}; \frac{9a^2}{4}\right)$	2p 3p												
b)	Studiem semnul diferenței $f(x) - g(x) = 2x^2 - 4ax$													

$\Rightarrow$ $f(x)-g(x)=0 \Leftrightarrow 2x^2-4ax=0 \Rightarrow \begin{cases} x_1=0 \Rightarrow f(0)=g(0)=0 \Rightarrow O(0,0) \\ x_2=2a \Rightarrow f(2a)=g(2a)=2a^2 \Rightarrow P(2a,2a^2) \end{cases}$	2p						
<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>2a</td></tr><tr><td>$f(x)-g(x)$</td><td>+++++0</td><td>-----0+++++</td></tr></table>	x	0	2a	$f(x)-g(x)$	+++++0	-----0+++++	
x	0	2a					
$f(x)-g(x)$	+++++0	-----0+++++					
$\Rightarrow f(x)-g(x) \leq 0, \forall x \in [0,2a] \Rightarrow g(x) \geq f(x), \forall x \in [0,2a]$ Calculăm $S = \int_0^{2a} (g(x)-f(x))dx = \int_0^{2a} (-2x^2+4ax)dx = \left(-2\frac{x^3}{3}+4a\frac{x^2}{2}\right)\bigg _0^{2a} = \frac{8a^3}{3}$	1p						
c) <div>$\text{Ecuatia dreptei OP: } \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2a & 2a^2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y-ax=0 \Rightarrow y=ax \overset{\text{not.}}{=} h(x)$</div> Notăm cu S_1 suprafața cuprinsă între curba lui g și dreapta OP Notăm cu S_2 suprafața cuprinsă între curba lui f și dreapta OP	1p						
$\Rightarrow S_1 = \int_0^{2a} (g(x)-h(x))dx = \int_0^{2a} (2ax-x^2)dx = \left(2a \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right)\bigg _0^{2a} = \frac{4a^3}{3}(1)$	2p						
$S_2 = \int_0^{2a} (h(x)-f(x))dx = \int_0^{2a} (2ax-x^2)dx = \frac{4a^3}{3}(2)$	2p						