

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 8**

Prof: Andrei Lenuța

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$C_5^3 = 10$ $10 - 10 = 0$	3p 2p
2.	$5x + 6 > 0 \Rightarrow x > -\frac{6}{5} \Rightarrow x \in \left(-\frac{6}{5}, +\infty\right)$ $5x + 6 = 36 \Rightarrow x = 6$ $6 \in \left(-\frac{6}{5}, +\infty\right)$, deci soluția ecuației este $x = 6$	1p 2p 2p
3.	Ecuția are rădăcini reale egale dacă $\Delta = 0$ $\Delta = b^2 - 4ac = (3m + 2)^2 - 4 = 9m^2 + 24m + 4 - 4 = 9m^2 + 24m$ $9m^2 + 24m = 0 \Rightarrow m_1 = -\frac{8}{3}$ și $m_2 = 0$	1p 2p 2p
4.	Fie x prețul inițial al produsului, atunci $x - \frac{5}{100}x = 190$ $\frac{95}{100}x = 190$ $x = \frac{190 \cdot 100}{95}$ $x = 200$ lei	2p 1p 1p 1p
5.	$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \Rightarrow \frac{x - 5}{0 - 5} = \frac{y - 4}{2 - 4}$ $2(x - 5) = 5(y - 4) \Rightarrow 2x - 5y + 10 = 0$	2p 3p
6.	Formula pentru aria triunghiului este $A_{\triangle DEF} = \frac{DE \cdot DF \cdot \sin D}{2}$ $A_{\triangle DEF} = \frac{12 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ}{2} = 36 \cdot \sin 60^\circ$ $A_{\triangle DEF} = 36 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 18\sqrt{3}$	2p 1p 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 12 & 12 \end{pmatrix}$	2p
	$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 12 & 12 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = 4A$	3p
b)	$X(a) \cdot X(b) = (aA + I_2)(bA + I_2) = abA^2 + aA + bA + I_2$	3p
	Ținând cont că $A^2 = 4A$ $\Rightarrow X(a) \cdot X(b) = 4abA + aA + bA + I_2 = (4ab + a + b)A + I_2 = X(a + b + 4ab)$	2p
c)	$X(a)$ inversabilă $X(a) \Leftrightarrow \det(X(a)) \neq 0$	1p
	$\det(X(a)) = \begin{vmatrix} a+1 & a \\ 3a & 3a+1 \end{vmatrix} = (a+1)(3a+1) - 3a^2$	2p
	$\det(X(a)) = 3a^2 + a + 3a + 1 - 3a^2 = 4a + 1 \neq 0$, pentru orice $a \in \mathbb{Z}$	2p
2. a)	Aplicăm relațiile lui Viète $x_1 + x_2 + x_3 = -4$ și $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = -10$	1p
	$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = (-4)^2 - 2(-10)$	3p
	$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 16 + 20 = 26$, este o constantă, deci nu depinde de m	1p
b)	$x_i (i = \overline{1, 3})$ rădăcină a lui $f \Rightarrow f(x_i) = 0 \Rightarrow x_i^3 = -4x_i^2 + 10x_i - m$	3p
	$\Rightarrow x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -4(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 10(x_1 + x_2 + x_3) - 3m$ Înlocuind $x_1 + x_2 + x_3 = -4$ și $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 26$ se obține $-144 - 3m = -9 \Rightarrow 3m = -135 \Rightarrow m = -4$	2p
c)	$x_1 + x_2 + x_3 = -4, x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = -10, x_1x_2x_3 = -m$	2p
	$d = \begin{vmatrix} x_1 + x_2 + x_3 & x_2 & x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 & x_3 & x_1 \\ x_1 + x_2 + x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} = (x_1 + x_2 + x_3) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & x_3 \\ 1 & x_3 & x_1 \\ 1 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} =$	2p
	$(x_1 + x_2 + x_3)(x_1x_2 + x_1x_3 + x_3x_2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2)$ $d = -4(-10 - 26) = -4(-36) = 144 \in \mathbb{N}$	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f'(x) = \left(\sqrt{x^2 + 2} \right)' = \frac{(x^2 + 2)'}{2\sqrt{x^2 + 2}}$	3p
	$= \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}$	2p
b)	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \Rightarrow$ funcția nu admite asimptotă orizontală	1p
	$y = mx + n, m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{x} = 1$	1p

	$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2} - x) \stackrel{\infty - \infty}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2 - x^2}{\sqrt{x^2 + 2} + x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\sqrt{x^2 + 2} + x} \right) = 0$ <p>Ecuția asimptotei ablice este $y = x$</p>	2p 1p
c)	<p>f convexă dacă $f''(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$</p> $f''(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}} \right)' = \frac{x' \sqrt{x^2 + 2} - x (\sqrt{x^2 + 2})'}{(\sqrt{x^2 + 2})^2} = \frac{\sqrt{x^2 + 2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2}}}{x^2 + 2}$ $\frac{x^2 + 2 - x^2}{(x^2 + 2)\sqrt{x^2 + 2}} = \frac{2}{(x^2 + 2)\sqrt{x^2 + 2}} \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$	1p 2p 2p
2. a)	$\int (x+9)^2 \cdot \frac{1}{x+9} dx = \int (x+9) dx$ $\int x dx + 9 \int dx = \frac{x^2}{2} + 9x + C$	2p 3p
b)	$f_2(x) = \frac{1}{x^2 + 9}$ $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 9} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(x^2 + 9)'}{x^2 + 9} dx$ $= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 9) \Big _0^1$ $= \frac{1}{2} (\ln(1+9) - \ln(0+9)) = \frac{1}{2} \ln \frac{10}{9}$	1p 2p 1p 2p
c)	<p>Aria este egală cu $\int_0^1 f_{2012}(x) dx$</p> $0 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq x^{2012} \leq 1 \Leftrightarrow 9 \leq x^{2012} + 9 \leq 10$ $\Leftrightarrow \frac{1}{10} \leq \frac{1}{x^{2012} + 9} \leq \frac{1}{9} \Leftrightarrow \frac{1}{10} \leq f_{2012}(x) \leq \frac{1}{9} \Leftrightarrow$ $\frac{1}{10} \leq \int_0^1 f_{2012}(x) dx \leq \frac{1}{9}$	1p 2p 1p 1p