

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Varianta 197

Prof. Pisică Lăcrămioara

SUBIECTUL I		(30 de puncte)
1.	0	5p
2.	12	5p
3.	2	5p
4.	40	5p
5.	640	5p
6.	3	5p
SUBIECTUL II		(30 de puncte)
1.	Desenează tetraedrul Notează tetraedrul	4p 1p
2.	$m_1 = S : 20$, unde S =suma mediilor tuturor elevilor $\Rightarrow S : 20 = 7 \Rightarrow S = 140$ $S = T + 5 \cdot 4$, unde T =suma mediilor elevilor promovați $\Rightarrow T = 120$ $m_2 = T : 15 \Rightarrow m_2 = 8$	2p 2p 1p
3.	Notăm cu x numărul de bomboane primite de Smaranda și cu y numărul de bomboane primite de Anca $x + 2 = y - 2 \Rightarrow y = x + 4$ $y + 2 = 2(x - 2) \Rightarrow y = 2x - 6$ Finalizare $x=10$ și $y=14$	1p 2p 2p
4.	a) $P(a, a) \in Gf \Rightarrow f(a) = a$ $2a - 3 = a \Rightarrow a = 3$ $P(3, 3) \in Gf$	2p 2p 1p

	$b) Gf \cap \left\{ l \left(\frac{3}{2}; 0 \right) \right\} \Rightarrow OA = \frac{3}{2} u.l.$ $Gf \cap \left\{ (0; -3) \right\} \Rightarrow OB = 3u.l.$ $A_{\Delta} \quad OA \cdot OB = \frac{9}{2}$	<p>3p</p> <p>2p</p>
5	$2 - \frac{3x+4}{x+3} = \frac{2-x}{x+3} \text{ și } 1 + \frac{3-x}{x+3} = \frac{6}{x+3}$ $E(x) = \frac{2-x}{x+3} \cdot \frac{x+3}{6} = \frac{2-x}{6}$ $6 \cdot E(n) = 2 - n \Rightarrow 2 - n \geq 1 \Rightarrow n \leq 1 \Rightarrow n = 1, \text{ pentru că } n \in \mathbb{N}$	<p>2p</p> <p>1p</p> <p>2p</p>
SUBIECTUL III		(30 de puncte)
1.	$a) P_{ABCD} = 4 \cdot AB \Rightarrow AB = 6dam$ $A_{QMNP} = 2 \cdot A_{ABCD} = 2 \cdot l^2 \Rightarrow A_{QMNP} = 72dam^2, \text{ unde } l = AB$ $1dam^2 = 1ar = 0,01ha \Rightarrow A_{QMNP} = 72ari = 0,72ha$	<p>2p</p> <p>2p</p> <p>1p</p>
	$b) A_{parc} = 4 \cdot A_{ABCD} + A_{\Delta}, \text{ unde } \{R\} = DC \cap$ $A_{\Delta} : \frac{DR \cdot PR}{2} = \frac{12 \cdot 6}{2} = 36dam^2 \Rightarrow A_{parc} = 180dam^2$ $A_{ANPD} = A_{parc} - A_{\Delta}$ $A_{\Delta} = \frac{AM \cdot MN}{2} = \frac{18 \cdot 12}{2} = 108dam^2 \Rightarrow A_{ANPD} = 72dam^2$ $x\% \cdot A_{parc} = A_{ANPD} \Rightarrow x = 40\%$	<p>2p</p> <p>2p</p> <p>1p</p>
	$c) P_{parc} = AM + MN + NP + DP + AD = 7 \cdot AD + DP$ $\Delta \quad \triangleleft \quad \Rightarrow DP^2 = DR^2 + RP^2 \Rightarrow DP = 4\sqrt{5}dam$	<p>2p</p> <p>1p</p>

	$P_{\text{parc}} = (42 + 6\sqrt{5})\text{dam} = (42 + \sqrt{180})\text{dam} > (42 + \sqrt{196})\text{dam} = 560\text{m}$	2p
2.	<p>a) $A_{ABCD} = \frac{(AB+CD) \cdot h_t}{2}$, unde h_t este înălțimea trunchiului de con</p> <p>$252 = \frac{56 \cdot h_t}{2} \Rightarrow h_t = 9\text{cm}$</p>	<p>2p</p> <p>3p</p>
	<p>b) $\frac{H-h_t}{H} = \frac{r}{R}$, unde H este înălțimea conului din care provine trunchiul</p> <p>$r = CD : 2 = 8\text{cm}$ și $R = AB : 2 = 20\text{cm}$</p> <p>Înlocuind, obținem $\frac{H-9}{H} = \frac{2}{5} \Rightarrow 5H - 45 = 2H \Rightarrow H = 15\text{cm}$</p> <p>$V_{\text{con}} = \frac{\pi R^2 H}{3} \Rightarrow V_{\text{con}} = \frac{\pi \cdot 400 \cdot 15}{3} \Rightarrow V_{\text{con}} = 2000\pi \text{ cm}^3$</p>	<p>1p</p> <p>1p</p> <p>1p</p> <p>2p</p>
	<p>c) $A_{\text{lat.con}} = A_{\text{sector.cerc}} \Rightarrow \pi R G = \frac{\pi R_1^2}{360^\circ} \cdot u^\circ$, unde $R_1 = G$ este raza cercului din care provine sectorul circular, iar u° reprezintă măsura în grade a unghiului la centru corespunzător acestui sector</p> <p>$G^2 = R^2 + H^2 \Rightarrow G = 25\text{cm}$</p> <p>$u^\circ = \frac{R}{G} \cdot 360^\circ \Rightarrow u^\circ = \frac{20}{25} \cdot 360^\circ \Rightarrow u^\circ = 288^\circ$</p>	<p>2p</p> <p>1p</p> <p>2p</p>