

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

Varianta: 60

Prof: Constantin Corina

| SUBIECTUL I  |                                                                                       | (30 de puncte) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.           | 100                                                                                   | 5p             |
| 2.           | 236, 238                                                                              | 5p             |
| 3.           | 14                                                                                    | 5p             |
| 4.           | 32                                                                                    | 5p             |
| 5.           | $243\sqrt{3}$                                                                         | 5p             |
| 6.           | -12                                                                                   | 5p             |
| SUBIECTUL II |                                                                                       | (30 de puncte) |
| 1.           | Desenează tetraedrul                                                                  | 4p             |
|              | Notează tetraedrul                                                                    | 1p             |
| 2.           | Se pun $27 \cdot 15 = 405$ mere în pungi                                              | 3p             |
|              | Rămân 10 mere în ladă                                                                 | 2p             |
| 3.           | Notăm cu $x$ prețul unui kg de mere și cu $y$ prețul unui kg de portocale             | 1p             |
|              | Avem sistemul de ecuații: $\begin{cases} 5x + 4y = 20,50 \\ 6x + 8y = 31 \end{cases}$ | 2p             |
|              | Rezolvând sistemul, obținem $x = 2,50$ și $y = 2$                                     | 2p             |
| 4.           | a) Din $f(x) = 0$                                                                     | 2p             |
|              | Obținem $x = -2$                                                                      | 2p             |
|              | Deci $A(-2, 0)$                                                                       | 1p             |
|              | b) Din $f(x) = g(x)$                                                                  | 2p             |

|               |                                                                                                          |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | Obținem $x = 1$                                                                                          | 2p             |
|               | Deci $B(1, 3)$                                                                                           | 1p             |
| 5             | $2x + 34 = 2(x + 17)$                                                                                    | 1p             |
|               | $\frac{5}{x-3} - \frac{4}{x+1} = \frac{x+17}{(x-3)(x+1)}$                                                | 2p             |
|               | $\frac{2(x+17)}{x-3} \cdot \frac{(x-3)(x+1)}{x+17} = 2x + 2$                                             | 2p             |
| SUBIECTUL III |                                                                                                          | (30 de puncte) |
| 1.            | a) $V_{prismă} = A_b \cdot h = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4} \cdot h = \sqrt{3} \cdot h$                        | 2p             |
|               | $V_{paralelipiped} = A_b \cdot h = l^2 \cdot h = 4h$                                                     | 1p             |
|               | $V_{cort} = 4h + \sqrt{3} \cdot h = 12 + 3\sqrt{3}$                                                      | 1p             |
|               | Deci $h = 3m$                                                                                            | 1p             |
|               | b) $A_{ABC} = \sqrt{3}$ ; $A_{ABB'A'} = 4$ ; $A_{BCEF} = 6$                                              | 2p             |
|               | $A_t = 2A_{ABC} + 2A_{ABB'A'} + 5A_{BCEF} = 38 + 2\sqrt{3}m^2$                                           | 2p             |
|               | $A_t \approx 42m^2$                                                                                      | 1p             |
|               | c) Fie $DT \parallel AE$ . Obținem $ATDE$ paralelogram                                                   |                |
|               | Avem $DT = CD = \sqrt{13}m(T.P.)$                                                                        | 1p             |
|               | Se demonstrează că $\triangle TCB$ dr. în $C \Rightarrow TC = 2\sqrt{3}m(T.P.)$                          | 1p             |
|               | Fie $DP \perp TC$ . Avem $DP = \sqrt{10}m(T.P.)$ . Deci $A_{DTC} = \frac{TC \cdot DP}{2} = \sqrt{30}m^2$ | 1p             |
|               | $A_{DTC} = \frac{DT \cdot DC \cdot \sin D}{2}$ . Deci $\sin D = \frac{2\sqrt{30}}{13}$                   | 2p             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2. | a) $AC = 30m(T.P.)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5p                                      |
|    | <p>b) Se determină lungimea înălțimii <math>\triangle ACB</math> de 24 m (<math>T.Î.</math>), deci <math>AD = 24m</math></p> <p>Se determină proiecția segmentului AC de 18 m (<math>T.C.</math>), deci <math>DC = 18m</math></p> <p><math>P_{ABCD} = 132m</math></p> <p>Deci se folosesc <math>132 \cdot 5 = 660m</math> de sârmă</p>                              | <p>1p</p> <p>1p</p> <p>1p</p> <p>2p</p> |
|    | <p>c) <math>\left. \begin{array}{l} \sphericalangle ACB \equiv \sphericalangle D(drepte) \\ \sphericalangle CAB \equiv \sphericalangle ACD(alt.in.) \end{array} \right  \Rightarrow \triangle CDA \sim \triangle ACB</math></p> <p>Deci <math>k = \frac{CD}{AC} = \frac{3}{5}</math></p> <p>Și atunci <math>\frac{A_{CDA}}{A_{ACB}} = k^2 = \frac{9}{25}</math></p> | <p>2p</p> <p>1p</p> <p>2p</p>           |