

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Varianta 10

Prof: Băscău Cornelia

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$\lg 10^6 = 6, \sqrt{10^6} = 10^3, \sqrt[3]{10^6} = 100$ $\lg 10^6 + \sqrt{10^6} + \sqrt[3]{10^6} = 1106$	3p 2p
2.	$x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow x \in \{5, -2\}$ $Gr_f \cap Ox = \{A(-2, 0), (5, 0)\}$	2p 3p
3.	$C.E.x > 0, \log_{27}^2 x^3 = (3 \log_{27} x)^2$ $not \log_{27} x = t \Rightarrow 9t^2 + 9t - 4 = 0 \Rightarrow t \in \left\{ \frac{1}{3}, -\frac{4}{3} \right\}$ $\log_{27} x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \sqrt[3]{27} \Rightarrow x = 3 \in \mathbb{N}$ $\log_{27} x = -\frac{4}{3} \Rightarrow x = \sqrt[3]{27^{-4}} \Rightarrow x = 3^{-4} \notin \mathbb{N}$	1p 2p 1p 1p
4.	$T_{k+1} = C_9^k (3x)^{9-k} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^k \Rightarrow x^{9-k} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^k = x^0$ $x^{9-k-\frac{1}{2}k} = x^0$ $k = 6 \Rightarrow T_{6+1} = C_9^6 3^3 = 2268$	2p 2p 1p
5.	$A(2, 0), B(4, 2), C(6, -4)$ $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} \Rightarrow x_G = 4$ $y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} \Rightarrow y_G = \frac{-2}{3}$	1p 2p 2p

6.	$6 \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right) \rightarrow \sin 6 < 0$	2p
	$7 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \sin 7 > 0$	1p
	$\sin 6 < \sin 7$	2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$f(-1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, f(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	2p
	$f(-1) + f(1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_2$	3p
b)	$f(2x) = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2x \end{pmatrix}$	2p
	$\begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	2p
	$x = \frac{1}{2}$	1p
c)	$f(x) \cdot f(x) = \begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix}$	1p
	$(f(x))^n = \begin{pmatrix} x^n & 0 \\ 0 & x^n \end{pmatrix}, \forall n \in \mathbb{N}^*$	1p
	$f(2) + \dots + (f(2))^{2014} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 2^{2014} & 0 \\ 0 & 2^{2014} \end{pmatrix} =$	1p
	$\begin{pmatrix} 2 + \dots + 2^{2014} & 0 \\ 0 & 2 + \dots + 2^{2014} \end{pmatrix} =$	1p
	$\begin{pmatrix} 2^{2015} - 2 & 0 \\ 0 & 2^{2015} - 2 \end{pmatrix}$	1p
2.	elemente inversabile $\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{8}$	2p
a)	$\hat{1} \cdot \hat{2} \cdot \hat{4} \cdot \hat{5} \cdot \hat{7} \cdot \hat{8} = \hat{8}$	3p
b)	$\hat{1} + \hat{2} + \dots + \hat{9} = \hat{0}$	2p
	$\hat{1} + \hat{2} + \dots + 2014 = \hat{1} + \hat{2} + \dots + \hat{7} = \hat{1}$	3p

c)	$\begin{cases} \hat{3}x + \hat{2}y = \hat{0} \\ \hat{4}x + \hat{5}y = \hat{1} \end{cases} \cdot \hat{2} \Rightarrow \begin{cases} \hat{6}x + \hat{4}y = \hat{0} \\ \hat{4}x + \hat{5}y = \hat{1} \end{cases} \Rightarrow$	2p
	$10x + 9y = 1 \Rightarrow x = 1$	2p
	$y = 3, S = \{(1, 3)\}$	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	$(x^{2014})' = 2014x^{2013}$	2p
a)	$(2014^x)' = 2014^x \ln 2014$ $f'(x) = 2014x^{2013} + 2014^x \ln 2014$	2p 1p
b)	$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ $x_0 = 0, y_0 = 1 - \ln 2014$ $f'(1) = \ln 2014$ $\ln 2014x - y + 1 - \ln 2014 = 0$	1p 1p 1p 2p
c)	$f''(x) = 2014 \cdot 2013x^{2012} + 2014^x \ln^2 2014$ $x^{2012} \geq 0, 2014^x > 0$ $f''(x) > 0 \Rightarrow f \text{ conv. pe } \mathbb{R}$	2p 1p 2p
2.	$\int_2^4 f(x) dx = \int_2^4 \frac{1}{x} dx + \int_2^4 \frac{1}{x+2} dx =$	2p
a)	$= (\ln x + \ln x+2)_2^4 =$ $= \ln 4 - \ln 2 + \ln 6 - \ln 4 = \ln \frac{6}{2} = \ln 3$	2p 1p
b)	$F \text{ prim. } f \Rightarrow F'(x) = f(x), \forall x \in [1, \infty)$ $F''(x) = f'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+2)^2} < 0$ $F''(x) < 0 \Rightarrow F \text{ conc. pe } [1, \infty)$	2p 2p 1p

c)	$V = \pi \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} \right)^2 dx =$ $\pi \left(\int_1^2 x^{-2} dx + \int_1^2 (x+2)^{-2} dx + 2 \int_1^2 \frac{1}{x(x+2)} dx \right) =$ $\pi \left(\frac{x^{-1}}{-1} \Big _1^2 + \frac{(x+2)^{-1}}{-1} \Big _1^2 + 2 \int_1^2 \frac{1}{(x+1)^2 - 1} (x+1)' dx \right) =$ $\pi \left(1 - 2^{-1} + 3^{-1} - 4^{-1} + 2 \frac{1}{2} \ln \left \frac{(x+1)-1}{(x+1)+1} \right \Big _1^2 \right) = \pi \left(\frac{7}{12} + \ln \frac{3}{2} \right)$	<p>2p</p> <p>2p</p> <p>1p</p>
----	---	-------------------------------