

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 40**

Prof. Lămătic Lidia Carmen

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$-10 \leq x + 2 \leq 10$ $-12 \leq x \leq 8$ $(-12) \cdot (-11) \cdot \dots \cdot 0 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 8 = 0$	2p 1p 2p
2.	$\Delta = (-2m)^2 - 4(m-1)(m+1) = -4$ $-\frac{\Delta}{4a} < 0 \Leftrightarrow \frac{4}{4(m-1)} < 0$ $m-1 < 0 \Rightarrow m \in (-\infty; 1)$	1p 2p 2p
3.	Notăm $5^x = y$ și obținem $y + 25y = \frac{26}{5}$ $y = \frac{1}{5} \Rightarrow x = -1$	3p 2p
4.	Sunt 90 de numere naturale de două cifre $\Rightarrow$ 90 de cazuri posibile Numerele de două cifre cuburi perfecte sunt 27, 64 $\Rightarrow$ 2 de cazuri favorabile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{1}{45}$	1p 2p 2p
5.	$m_d = -2$ $m_d \cdot m_{d'} = -1 \Rightarrow m_{d'} = \frac{1}{2}$	1p 2p 2p

	Ecuția perpendicularității este $y - y_A = \frac{1}{2}(x - x_A) \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$	
6.	$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC}$	2p
	$\cos B = \frac{5}{9}$	3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.	$A \in P \Rightarrow A^2 = I_3$	1p
a)	$B^2 = \frac{1}{4}(A^2 + A + A + I_3) = \frac{1}{4}(I_3 + A + A + I_3)$	2p
	$= \frac{1}{2}(A + I_3) = B \in Q$	2p
b)	$A \in Q \Rightarrow A^2 = A$	1p
	$C^2 = 4A^2 - 2A - 2A + I_3 = 4A - 2A - 2A + I_3$	2p
	$= I_3 = C \in P$	2p
c)	$\det A = 1 \neq 0$, deci matricea este inversabilă $\forall a, b \in \mathbb{R}$	1p
	$A^* = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 - b \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	2p
	$A^{-1} = A^* = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 - b \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	2p
2.	$xy + yx = yx + xy$, adevărat $\forall x, y \in I \Rightarrow "*" \text{ comutativă}$	1p
a)	$(x * y) * z = xyz + yxz + zxy + zyx, \quad x * (y * z) = xyz + xzy + yzx + zyx$	2p
	"*" nu este asociativă, deoarece $(I, +, \cdot)$ este inel necomutativ	2p
b)	Datorită comutativității este suficientă verificarea distributivității la stânga sau la dreapta.	1p

	$x * (y + z) = x(y + z) + (y + z)x = xy + yx + xz + zx = (x * y) + (x * z), \forall x, y, z \in I$	4p
c)	$x^2 * (y * x) = x^2 * (yx + xy) = x^2 yx + x^3 y + yx^3 + xyx^2$	2p
	$(x^2 * y) * x = (x^2 y + yx^2) * x = x^2 yx + yx^3 + x^3 y + xyx^2$	2p
	concluzie	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	Nu avem asimptote verticale	1p
a)	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0 \Rightarrow y = 0$ asimptotă orizontală la $+\infty$	2p
	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{-x} = -\infty \Rightarrow$ nu există asimptotă orizontală la $-\infty$	1p
	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^x} = \infty \Rightarrow$ nu există asimptotă oblică la $-\infty$	1p
b)	$f'(x) = \frac{1-x}{e^x}, \forall x \in \mathbb{R}$	1p
	$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$	1p
	f strict crescătoare pe $(-\infty, 1)$, f strict descrescătoare pe $(1, +\infty)$	2p
	$f(1) = \frac{1}{e} \Rightarrow A\left(1; \frac{1}{e}\right)$ punct de maxim	1p
c)	$f''(x) = \frac{x-2}{e^x}, \forall x \in \mathbb{R}$	2p
	$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 2$	1p
	$f''(x) < 0, \forall x < 2; f''(x) > 0, \forall x > 2 \Rightarrow x = 2$ punct de inflexiune	2p
2.		2p
a)	$f(1) = 3, f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}, x \neq 1$	
	$f(x) > 0, x \in \mathbb{R} \Rightarrow f$ este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$	3p

b)	$F(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ <p>F strict crescătoare $\Rightarrow$ F injectivă</p> <p>$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = +\infty \Rightarrow$ F surjectivă</p> <p>Deci, F este bijectivă $\Rightarrow$ F inversabilă</p>	<p>1p</p> <p>1p</p> <p>2p</p> <p>1p</p>
c)	$F(0) = 0, F(1) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$ $\int_0^{\frac{11}{6}} F^{-1}(x) dx = \int_{F(0)}^{F(1)} F^{-1}(x) dx = \int_0^1 F^{-1}(F(x)) F'(x) dx = \int_0^1 x f'(x) dx = \left. \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right _0^1 = \frac{13}{12}.$	<p>2p</p> <p>3p</p>