

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Varianta 44**

Prof: Marcu Ștefan Florin

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

**SUBIECTUL I (30 de puncte)**

|    |                                                                                                                                                    |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Se observă că avem o sumă de 7 termeni în progresie geometrică cu rația $q = -\frac{1}{3}$<br><br>Atunci $S = \frac{3}{4}(1 + \frac{1}{3^7})$      | 3p<br><br>2p           |
| 2. | $f(0) = 1, g(0) = 3$<br><br>$f(g(0)) = f(3) = 7, g(f(0)) = g(1) = 4$<br><br>$f(g(0)) - g(f(0)) = 3$                                                | 1p<br><br>2p<br><br>2p |
| 3. | $x \geq 3$<br><br>$x^2 + 1 = (x - 3)^2$<br><br>$6x = 8 \Rightarrow x = \frac{4}{3} \Rightarrow$ Ecuația nu are soluții reale .                     | 1p<br><br>2p<br><br>2p |
| 4. | Cifrele pare nenule sunt 2,4,6,8<br><br>Numărul cerut este $A_4^3 = 24$                                                                            | 2p<br><br>3p           |
| 5. | $x \cdot \vec{u} + y \cdot \vec{v} = (x + y) \cdot \vec{i} + (x - y) \cdot \vec{j}$<br><br>Atunci $x + y = 5, x - y = -1 \Rightarrow x = 2, y = 3$ | 2p<br><br>3p           |
| 6. | $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$                                                                                 | 2p                     |

|  |                                   |    |
|--|-----------------------------------|----|
|  | $\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$ | 1p |
|  | $\sin 2x = \frac{4\sqrt{2}}{9}$   | 2p |

**SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Calculăm aria triunghiului $OA_m A_n, m, n \in N$                                                                                                                                                                                                     | 2p             |
| a) | $\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2m-1 & 2m+1 & 1 \\ 2n-1 & 2n+1 & 1 \end{vmatrix}$ $\Delta = 4(m-n) \Rightarrow \text{Aria} = \frac{1}{2}  \Delta  = 2 m-n $ <p>Atunci, aria triunghiului <math>OA_{2013} A_{2014}</math> este egală cu 2 .</p> | 2p<br>1p       |
| b) | <p>Se verifică condiția de coliniaritate a trei puncte :</p> $\begin{vmatrix} 2m-1 & 2m+1 & 1 \\ 2n-1 & 2n+1 & 1 \\ 2p-1 & 2p+1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ <p>Prin calcul, obținem egalitatea .</p>                                                       | 3p<br>2p       |
| c) | <p>Observăm că punctele <math>A_0, A_1, \dots, A_{2014}</math> sunt coliniare ( din b )</p> <p>Atunci dreptele distincte sunt : <math>OA_0, OA_1, \dots, OA_{2014}, A_0 A_{2014}</math></p> <p>În total avem 2016 drepte .</p>                        | 1p<br>2p<br>2p |
| 2. | $(x-1)(y-1)+1=xy-x-y+2$                                                                                                                                                                                                                               | 1p             |
| a) | <p>Dar <math>xy-x-y+2=x \cdot y-ax-ay+2</math></p> <p>Deci <math>a=1</math></p>                                                                                                                                                                       | 3p<br>1p       |
| b) | <p>Aflăm mai întâi elementul neutru al legii : <math>x \circ e = e \circ x = x, \forall x \in R \Rightarrow e = 2</math></p> <p>Verificăm condiția de simetric : <math>\frac{2014}{2013} \circ 2014 = 2014 \circ \frac{2014}{2013} = 2</math></p>     | 3p<br>2p       |

|    |                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------|----|
| c) | $x \circ x = x^2 - 2ax + 2 > 0, (\forall)x \in \mathbb{R}$ | 2p |
|    | $\Delta = 4a^2 - 8 < 0$                                    | 2p |
|    | $a \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$                              | 1p |

**SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)**

|          |                                                                     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.<br>a) | Calculăm $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$                      | 2p |
|          | $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0$                  | 2p |
|          | Dreapta $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $-\infty$ .          | 1p |
| b)       | $f'(x) = \left( \frac{e^x}{x} \right)' =$                           | 1p |
|          | $= \frac{e^x \cdot x - e^x}{x^2} =$                                 | 2p |
|          | $= \frac{e^x(x-1)}{x^2}.$                                           | 2p |
| c)       | Dacă $x > 1 \Rightarrow f'(x) > 0$                                  | 1p |
|          | Deci $f$ este strict crescătoare pe intervalul $(1, +\infty)$       | 1p |
|          | Dar $1 < \ln 2013 < \ln 2014 \Rightarrow f(\ln 2013) < f(\ln 2014)$ | 1p |
|          | Deci $\frac{2014}{\ln 2014} > \frac{2013}{\ln 2013}.$               | 2p |
| 2.<br>a) | $I_1 = \int_0^1 x \cdot (1-x) dx =$                                 | 2p |
|          | $= \left( \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big _0^1 =$        | 2p |
|          |                                                                     | 1p |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | $= \frac{1}{6}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| b) | <p>Arătăm că șirul <math>(I_n)_{n \in \mathbb{N}}</math> este strict descrescător și mărginit</p> <p>Din <math>x \in (0,1) \Rightarrow 1-x \in (0,1) \Rightarrow (1-x)^n &gt; (1-x)^{n+1} \Rightarrow I_{n+1} &lt; I_n</math></p> <p>Evident <math>I_n &gt; 0</math>. Dar <math>(1-x)^n &lt; 1 \Rightarrow I_n &lt; \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}</math></p> | <p>1p</p> <p>2p</p> <p>2p</p> |
| c) | <p>Efectuăm schimbarea de variabilă <math>u = 1-x</math></p> <p>Atunci <math>I_n = \int_0^1 (1-u) \cdot u^n du =</math></p> $= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$                                                                                                                                                                       | <p>2p</p> <p>1p</p> <p>2p</p> |