

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 46***Prof: Nicolaescu Nicolae*

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$\left[\sqrt{2014} \right] = 44 \quad \sqrt{\left[\frac{2014}{2013} \right]} = 1$	2p
	$\left[\sqrt{2014} \right] + \sqrt{\left[\frac{2014}{2013} \right]} = 45$	2p
		1p
2.	Condiția ca șirul să fie progresie aritmetică $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}, \forall n \geq 2$	2p
	$5n - 3 = \frac{5n - 8 + 5n + 2}{2}$ deci șirul este o progresie aritmetică	3p
3.	$x_1 + x_2 = -3, x_1 x_2 = 3$	2p
	$x_1^2 + x_2^2 = (-3)^2 - 2 \cdot 3 = 3$	2p
	$\frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = \frac{3}{3} = 1$	1p
4.	$f \circ f = f \Rightarrow 9x + 4 = 1 + 3x$	3p
	$x = -\frac{1}{2}$	2p
	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \frac{3}{9} + \sin^2 x = 1 \Rightarrow \sin x = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$	2p
	$x \in \left(0, \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow \sin x = \frac{\sqrt{6}}{3}$	2p

5.	$tg x = \frac{\sin x}{\cos x} = \sqrt{2}$	1p
6.	$A_{\Delta ABC} = \frac{6 \cdot 8 \cdot \sin \frac{\pi}{6}}{2} = 12$	2p
	$A_{\Delta ABO} = \frac{A_{\Delta ABC}}{2} = 6$ (BO mediană în triunghiul ABC)	3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	Determinantul este egal cu $3m^2 + 3m$	5p
b)	$\det A \neq 0$	2p
	$3m^2 + 3m \neq 0 \Rightarrow m \in \mathbb{R} - \{-1, 0\}$	3p
c)	Pentru $m = -1$ sistemul devine $\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ -x - y + z = -1 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$	1p
	Adunând ecuația a doua și ecuația a treia obținem $0 = 1$	3p
	Sistemul este incompatibil	1p
2. a)	$f(0) = 1$	5p
b)	$x_1 + x_2 + x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{-1}{2} \Rightarrow m^2 + n^2 + m + n = -\frac{1}{2}$	2p
	$\left(m + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 = 0$	2p
		1p

	$m = n = -\frac{1}{2}$	
	$f = X^3 - X^2 + X + 1$	1p
c)	$S = \left[\frac{100 \cdot 101}{2} \right]^2 - \frac{100 \cdot 101 \cdot 201}{6} + \frac{100 \cdot 101}{2} + 100$	3p
	$S = 25.169.300$	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f'(x) = -\frac{4028}{(x-2)^2}$	5p
	$f'(x) < 0$ pe intervalele $(-\infty, 2)$ și $(2, \infty)$ deci f descrescătoare pe $(-\infty, 2)$	1p
b)	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2014$	3p
	$f(x) < 2014, \forall x \in (-\infty, 2)$	1p
c)	$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \arctg^2 \sqrt{x-2} \cdot f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{\arctg^2 \sqrt{x-2}}{(\sqrt{x-2})^2} \cdot \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} 2014x$ $= 1 \cdot 4028 = 4028$	3p 2p
2. a)	$f'(x) = g(x)$ f este o primitivă a lui g	4p 1p
b)	$\int_1^e g(x) dx = x^3 (\ln x - 1) \Big _1^e = 1$	5p
c)	$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^3 \ln x - \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^3 = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^3}} = 0$	2p 3p

	$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^3}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-3x^2}{x^6}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^3}{-3} = 0$	
--	---	--

www.mateinfo.ro