

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 54**

Prof: Oancea Cristina

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$A_n^1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1)} = n$ $C_n^1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1)} = n$ $n + n = 36 \Rightarrow 2n = 36 \Rightarrow n = 18$	3p 2p
2.	$215 + \frac{10}{100} \cdot 215 = 215 + 21,5 = 236,5$	1p 2p 2p
3.	$(\sqrt{6})^2 < 3^2 < (\sqrt{12})^2$	1p 2p 2p
4.	$-11 \leq 3 \cdot x + 2 \leq 11$ $-13 \leq 3 \cdot x \leq 9$ $\Rightarrow \frac{-13}{3} \leq x \leq 3$ $x \in \left[\frac{-13}{3}; 3 \right]$	2p 3p
5.	$m=0$ $m=2$	2p 3p

6.	$\cos 120^\circ = -\cos(180 - 120)^\circ = -\cos 60^\circ$	2p
	$\cos 110^\circ = -\cos(180 - 110)^\circ = -\cos 70^\circ$	1p
	$\cos 100^\circ = -\cos(180 - 100)^\circ = -\cos 80^\circ$	2p
	$\cos 60^\circ + \cos 70^\circ + \cos 80^\circ$	
	$-\cos 80^\circ - \cos 70^\circ - \cos 60^\circ = 0$	

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$A^2 = \begin{pmatrix} 20 & -17 \\ 72 & 25 \end{pmatrix}$	2p
	$B^2 = \begin{pmatrix} 12 & 15 \\ -56 & -23 \end{pmatrix}$	2p
	$A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 32 & -12 \\ 16 & 2 \end{pmatrix}$	1p
b)	$\text{Det}(A+B)=8 \cdot 8=64$	3p
	$\text{Det}(A)=38$	2p
	$\text{Det}(B)=30$	
	$\Rightarrow \text{Det}(A+B) \neq \text{Det}(A) + \text{Det}(B)$	
c)	$C = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$	1p
	$\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8^2 & 0 \\ 0 & 8^2 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 8^{2014} & 0 \\ 0 & 8^{2014} \end{pmatrix}$	2p
	$= \begin{pmatrix} \frac{8^{2014}-2}{7} & 0 \\ 0 & \frac{8^{2014}-2}{7} \end{pmatrix} = \frac{8^{2014}-2}{7} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	2p
	$= \frac{8^{2014}-2}{7} \cdot I_2$	
2. a)	$C = x^2 - 5x + 6$	1p
	$\text{restul} = 0$	3p
		1p
b)		3p

	$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 81 - 2 \cdot 26 = 81 - 52 = 29$	2p
c)	$(x-4)(x-3)(x-2)$	2p 2p 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f'(x) = \frac{-3}{x^2} - \frac{3}{(x+2)^2} \Rightarrow f'(1) = -\frac{10}{3}$	2p 2p 1p
b)	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)^3 + x^3}{x^3 \cdot (x+2)^3} = \frac{1}{\infty} = 0$	1p 1p 1p 2p
c)	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \cdot \left[\frac{-3 \cdot (x^2 + 4x + 4) - 3x^2}{x^2 \cdot (x+2)^2} \right]$ $= \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \cdot \frac{(-12x + 12)}{x^4 + 4 \cdot x^3 + 4x^2}$ $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-12x^4(x-1)}{x^4 + 4x^3 - 4x^2} = -12$	1p 1p 1p 2p
2. a)	$\int_0^3 (x-3)^2 dx = \int_0^3 x^2 - 6x + 9 dx = \frac{x^3}{3} - 6 \frac{x^2}{2} + 9x \Big _0^3$ $= \frac{27}{3} - 6 \frac{9}{2} + 9 \cdot 3 = 9 - 27 + 27 = 9 + \emptyset$	2p 2p 1p
b)	$\int_0^3 (x-3)^{2014} dx = \frac{(x-3)^{2015}}{2015} \Big _0^3 = \frac{3^{2015}}{2015} + \emptyset$	1p 1p 1p 2p

c)	$\int_0^3 x \cdot f_n(x) dx$ $f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1$ $g(x) = (x-3)^n \Rightarrow g(x) = \frac{(x-3)^{n+1}}{n+1}$ $x \cdot \frac{(x-3)^{n+1}}{n+1} - \int_0^3 \frac{(x-3)^{n+1}}{n+1} dx$ $= \frac{x \cdot (x-3)^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(x-3)^{n+2}}{n+2} \Big _0^3 =$ $= \frac{-(-3)^{n+2}}{(n+1)(n+2)} + 0$	2p 1p 2p