

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 60**

Prof: Păcurar Cornel-Cosmin

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$b_1 + b_3 = 5$ și $b_3 + b_5 = 20 \Leftrightarrow b_1(1 + q^2) = 5$ și $\Leftrightarrow b_1 q^2(1 + q^2) = 20$ $\Rightarrow q^2 = 4 \Leftrightarrow q = \pm 2$ $q > 0 \Rightarrow q = 2$	2p 2p 1p
2.	$\Delta \geq 0 \Leftrightarrow a^2 - 8a + 4 \geq 0$ Finalizare: $a \in (-\infty, 4 - 2\sqrt{3}] \cup [4 + 2\sqrt{3}, +\infty) - \{0\}$	3p 2p
3.	$2x - 3 > 0, x - 1 > 0, 5 - 2x > 0 \Leftrightarrow x \in \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$ $\ln \frac{4x^2 - 12x + 9}{x - 1} = \ln(5 - 2x) \Leftrightarrow 6x^2 - 19x + 14 = 0$ $x_1 = 2 \in \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right), x_2 = \frac{7}{6} \notin \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$	1p 2p 2p
4.	$C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}, A_n^2 = n(n-1)$ $\frac{n(n-1)}{2} + n(n-1) = 63 \Leftrightarrow n(n-1) = 42$ $n \in \mathbb{N} \Rightarrow n = 7$	1p 3p 1p
5.	$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 2011^2 - 2012^2 < 0$	3p 2p

	$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 2011^2 - 2012^2 < 0$ $\Rightarrow$ vectorii $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ formează un unghi obtuz	
6.	$C = \pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right)$ $\frac{AB}{\sin C} = 2R$ $\sin C = \sin \left(\pi - \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) \right) = \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ Finalizare: $R = 6(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	1p 2p 1p 1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.	$a + 1 + 1 = 5 \Leftrightarrow a = 3$ a) $4 - 1 - 3 = b \Leftrightarrow b = 0$ $2 + 3 + 4 = 9$ este adevărat	2p 2p 1p
b)	Sistemul este incompatibil dacă $\Delta = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 0$ și $\Delta_c = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 9 & 3 & 4 \\ b & -1 & -3 \end{vmatrix} \neq 0$ $\Rightarrow a = 3, b \neq 0$	3p 2p
c)	Pentru $b = 7$ avem sistemul $\begin{cases} ax + y + z = 5 \\ 2x + 3y + 4z = 9 \\ 4x - y - 3z = 7 \end{cases}$ care este compatibil pentru orice $a \in \mathbb{R}$ $(0, 11, -6)$ este soluția cu toate componentele întregi, $\forall a \in \mathbb{Z}$	3p 2p
2.	Rădăcinile întregi ale lui f se găsesc printre divizorii lui 10	2p
a)	$f(2) = 0 \Rightarrow x = 2 \in \mathbb{Z}$ e rădăcină a lui f	3p

b)	$x_1 + x_2 + \dots + x_5 = 2, x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_4x_5 = -1$ $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_5^2 = (x_1 + x_2 + \dots + x_5)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_4x_5) = 2^2 - 2 \cdot (-1) = 6$ $(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_3)^2 + (x_1 - x_4)^2 + (x_1 - x_5)^2 + (x_2 - x_3)^2 + \dots + (x_4 - x_5)^2 =$ $= 4(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_5^2) - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_4x_5) = 18$	2p 1p 2p
c)	$f = (X - 2) \left[(X^2 - 1)^2 + (X + 2)^2 \right]$ $(x^2 - 1)^2 + (x + 2)^2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow f \text{ are o singură soluție reală}$	2p 2p 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f'(x) = 3x^2 + 1001 > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ strict crescătoare} \Rightarrow f \text{ injectivă}$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \text{ și } f \text{ este continuă, deci } f \text{ surjectivă}$ <p>Va rezulta că ecuația $f(x) = y$ are soluție unică, $\forall y \in \mathbb{R}$</p>	2p 2p 1p
b)	$h(x) = x^3 + 1001x - 20014 - \frac{1}{n+2012}$ $h(2) < 0, h(3) > 0 \Rightarrow x_n \in (2; 3)$ $x_{n+1}^3 - x_n^3 < 0 \Rightarrow x_{n+1} - x_n < 0$ $\Rightarrow (x_n) \text{ convergent și } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [2; 3]$ $(x_n - 2)(x_n^2 + 2x_n + 1007) = \frac{1}{n+2012} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$	1p 1p 1p 2p
c)	$n(x_n - 2) = \frac{n}{(x_n^2 + 2x_n + 1007) \cdot (n + 2012)}$	3p 2p

	$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 2) = \frac{1}{1015}$	
2.		2p
a)	$F'(x) = f(x) = \begin{cases} \frac{x^{2011} - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 2011, & x = 1 \end{cases}$ $x < 1 \Rightarrow x^{2011} - 1 < 0, x - 1 < 0 \Rightarrow \frac{x^{2011} - 1}{x - 1} > 0$ $x > 1 \Rightarrow x^{2011} - 1 > 0, x - 1 > 0 \Rightarrow \frac{x^{2011} - 1}{x - 1} > 0$ $\Rightarrow F'(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow F \text{ este strict crescătoare pe } \mathbb{R}$	1p 1p 1p
b)	$F(x) = x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{2011}}{2011}$ $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty, F \text{ continuă} \Rightarrow \text{Im } F = \mathbb{R} \Rightarrow F \text{ surjectivă}$ <p>Din a) $\Rightarrow F$ injectivă</p> <p>Deci F bijectivă</p>	1p 2p 1p 1p
c)	<p>Cu schimbarea de variabilă $F^{-1}(x) = t \Leftrightarrow x = F(t) \Rightarrow dx = f(t) dt$</p> $\int_0^a F^{-1}(x) dx = \int_0^1 t f(t) dt = \left(\frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2013}}{2013} \right) \Big _0^1 =$ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2013}$	2p 2p 1p