

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 62**

Prof: Pascotescu Camelia

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$z = a + ib \Rightarrow \bar{z} = a - ib$ $2(a - ib) + a + ib = 3 + 2i \Rightarrow 3a - ib = 3 + 2i$ $\Rightarrow a = 1, b = -2 \Rightarrow z = 1 - 2i$	1p 2p 2p
2.	Din Relațiile lui Viète avem $x_1 + x_2 = -\frac{-3}{1} = -3$ și $x_1 x_2 = \frac{1}{1} = 1$ Deci $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = (-3)^2 - 2 \cdot 1 = 7$	2p 3p
3.	Fie $t = 2^x > 0$. Rezultă $-2t^2 + t + 1 = 0$ $t_1 = 1, t_2 = -\frac{1}{2}$. Deoarece $t_1 > 0, t_2 < 0$ și $t > 0 \Rightarrow t = 1$ $\Rightarrow 2^x = 1 \Rightarrow x = 0$	2p 2p 1p
4.	Numărul submulțimilor căutate este C_5^3 $= \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5!}{3! \cdot 2} = \frac{4 \cdot 5}{2!} = 10$	2p 3p
5.	Distanța de la un punct $A(x_0, y_0)$ la dreapta $d: ax + by + c = 0$ este $d(A, d) = \frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$. Deci $d(A, d) = \frac{ 2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 - 1 }{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{10}{\sqrt{13}} = \frac{10\sqrt{13}}{13}$	2p 3p
6.	Prin ridicare la pătrat obținem $\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1$ de unde $\sin 2x = 0$	3p 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\alpha \circ \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$	5p
b)	$x \circ \alpha = \beta \Rightarrow x = \beta \alpha^{-1}$ $\alpha^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ $x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$	1p 2p 2p
c)	<p>Numărul de inversiuni al permutării α este $m(\alpha) = 3 \Rightarrow \epsilon(\alpha) = (-1)^3 = -1$, deci α e impară.</p> <p>Dar oricare ar fi $x \in S_4$ avem $\epsilon(x^4) = 1$, deci x^4 este permutare pară.</p> <p>În concluzie, ecuația $x^4 = \alpha$ nu are soluție.</p>	2p 2p 1p
2. a)	$f(-1) = [1 + (-1) + (-1)^3]^{30} = (-1)^{30} = 1$ $f(1) = [1 + 1 + 1^3]^{30} = 3^{30}$ $f(-1) + f(1) = 1 + 3^{30}$	2p 2p 1p
b)	<p>Avem $f(1) = a_0 + a_1 + \dots + a_{30}$</p> <p>Dar $f(1) = 3^{30} \Rightarrow a_0 + a_1 + \dots + a_{30} = 3^{30}$</p> <p>Deci $a_0 + a_1 + \dots + a_{30} : 3$</p>	2p 2p 1
c)	$f(X) = (X^2 - 1)q(X) + aX + b$ $\left. \begin{array}{l} X=1 \Rightarrow f(1) = a+b \Rightarrow a+b = 3^{30} \\ X=-1 \Rightarrow f(-1) = -a+b \Rightarrow -a+b = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow a = \frac{3^{30}-1}{2}, b = \frac{3^{30}+1}{2}$ <p>Resul căutat este $aX + b = \frac{3^{30}-1}{2}X + \frac{3^{30}+1}{2}$.</p>	2p 2p 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

a)	$f'(x) = \frac{(e^x)'x^2 - e^x(x^2)'}{x^4}$ $= \frac{e^x x^2 - e^x(2x)}{x^4}$ $= \frac{e^x(x^2 - 2x)}{x^4} = \frac{e^x x(x-2)}{x^4} = \frac{e^x(x-2)}{x^3}$	2p 2p 1p
b)	$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ Pe $(-\infty, 0) \cup (2; \infty)$ avem $f'(x) > 0$, deci f este strict crescătoare. Pe $(0; 2)$ avem $f'(x) < 0$, deci f este strict descrescătoare.	2p 2p 1p
c)	$\left. \begin{array}{l} \sqrt{3}, \sqrt{2} \in (0; 2) \\ \sqrt{2} < \sqrt{3} \\ f \text{ descrescătoare pe } (0; 2) \end{array} \right\} \Rightarrow f(\sqrt{3}) < f(\sqrt{2})$ $\frac{e^{\sqrt{3}}}{3} < \frac{e^{\sqrt{2}}}{2} \Rightarrow 2e^{\sqrt{3}} < 3e^{\sqrt{2}}$	3p 2p
2. a)	$2I_1 + 3I_2 = \int \frac{2\sin x + 3\cos x}{2\sin x + 3\cos x} dx$ $2I_1 + 3I_2 = \int dx = x + C \quad (1)$	2p 3p
b)	$2I_2 - 3I_1 = \int \frac{2\cos x - 3\sin x}{2\sin x + 3\cos x} dx = \int \frac{(2\sin x + 3\cos x)'}{2\sin x + 3\cos x} dx$ $2I_2 - 3I_1 = \ln 2\sin x + 3\cos x + C \quad (2)$	3p 2p
c)	Rezolvând sistemul format din (1) și (2) rezultă $I_1 = \frac{1}{13}(2x - 3\ln 2\sin x + 3\cos x) + C$ $I_2 = \frac{1}{13}(3x + 2\ln 2\sin x + 3\cos x) + C$	3p 2p