

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Varianta 64

Prof: Pistică Lăcrămioara

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$1 < \log_{\frac{5}{3}} 2 < 2$ $2 < \sqrt[3]{9} < 3$ $A = \{2\} \Rightarrow \text{card} A = 1$	2p 1p 2p
2.	$\min im = -\frac{\Delta}{4a} < 0$ $m < \frac{9}{4}$ $m \in \mathbb{N}^* \Rightarrow m \in \{1, 2\}$	1p 2p 2p
3.	$3 \cdot 2^x + 4 > 0 \ (A) \Rightarrow x \in \mathbb{R}$ $3 \cdot 2^x + 4 = 2^{x+2}$ $2^x = 4 \Rightarrow x = 2$	1p 2p 2p
4.	$T_{k+1} = C_9^k \left(\frac{1}{x}\right)^{9-k} (\sqrt{x})^k$ $x^{\frac{3k}{2}-9} = x^0$ $k = 6 \Rightarrow T_7 = C_9^6$	2p 1p 2p
5.	M este mijlocul lui AN : $\left(x_M = \frac{x_A + x_N}{2}, y_M = \frac{y_A + y_N}{2} \right)$ N este mijlocul lui MB : $\left(x_N = \frac{x_M + x_B}{2}, y_N = \frac{y_M + y_B}{2} \right)$ A(1, -2) , B(-5, 7)	2p 3p
6.	$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$ $\cos B = -\frac{1}{20} < 0 \Rightarrow m(\sphericalangle B) > 90^\circ$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\det(A) = (m+1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2m & 1 & m^2 \\ m^2 & 2m & 1 \end{vmatrix}$ $\det(A) = (m+1)^2 (m^2 - m + 1)^2$ $\det(A) \neq 0 \Rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	2p 1p 2p
b)	<p>Fie (x_0, y_0, z_0) soluția sistemului</p> <p>Adunând cele 3 ecuații obținem $(m+1)^2 (x_0 + y_0 + z_0) = 0$</p> <p>știind că $m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ obținem $x_0 + y_0 + z_0 = 0$</p>	3p 2p
c)	$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rang} A = 2$ <p>$\text{rang} \bar{A} = 2 \Rightarrow$ sistem compatibil nedeterminat</p> <p>soluția sistemului $(\alpha - 3, \alpha + 1, \alpha), \alpha \in \mathbb{R}$</p>	2p 1p 2p
2. a)	$x \circ (-1) = x \Rightarrow x(-a + b - 1) + c - b = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = b - 1 \\ c = b \end{cases}$ $\frac{1}{2} \circ \left(-\frac{11}{8}\right) = -1 \Rightarrow 11a + 14b - 16c = 16$ <p>se obțin valorile $a = 2$, $b = 3$, $c = 3$</p>	2p 1p 2p
b)	$x \circ y = 2 \left(x + \frac{3}{2}\right) \left(y + \frac{3}{2}\right) - \frac{3}{2} \Rightarrow x \circ x \circ x = 4 \left(x + \frac{3}{2}\right)^3 - \frac{3}{2}$ <p>notând $t = x + \frac{3}{2}$ ecuația devine $4t^3 = t$ cu soluțiile $t \in \left\{0, \pm \frac{1}{2}\right\}$</p> <p>știind că $x \in G \Rightarrow$ soluția ecuației este $x = -1$</p>	2p 2p 1p
c)	<p>f morfism $\Rightarrow f(x \circ y) = f(x) + f(y)$</p> $\ln(2mxy + 3mx + 3my + 3m + n) = \ln(mx + n) + \ln(my + n) \Rightarrow \begin{cases} m^2 = 2m \\ 3m = mn \\ 3m + n = n^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 2 \\ n = 3 \end{cases}$ <p>$f: G \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(2x + 3)$ funcție bijectivă</p>	1p 2p 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f(x) = \begin{cases} 2x - 3 + \ln x & , x \in \left[\frac{3}{2}, \infty\right) \\ -2x + 3 + \ln x & , x \in \left(-\infty, \frac{3}{2}\right) \end{cases}$ <p>f continuă și derivabilă pe $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{2}\right\}$</p> <p>$\lim_s \left(\frac{3}{2}\right) = \lim_d \left(\frac{3}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) \Rightarrow f$ continuă în $x = \frac{3}{2}$</p> <p>$f'_s\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{4}{3}$, $f'_d\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{8}{3} \Rightarrow f$ nu este derivabilă în $x = \frac{3}{2}$</p>	1p 1p 1p 2p
b)	$f'(x) = \begin{cases} 2 + \frac{1}{x} & , x \in \left(\frac{3}{2}, \infty\right) \\ -2 + \frac{1}{x} & , x \in \left(-\infty, \frac{3}{2}\right) \end{cases}$ <p>$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$</p> <p>f crescătoare pe fiecare din intervalele $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$, $\left[\frac{3}{2}, \infty\right)$ și descrescătoare pe $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right] \Rightarrow$ $x = \frac{1}{2}$ punct de maxim local și $x = \frac{3}{2}$ punct de minim local</p>	1p 1p 1p 2p
c)	<p>prima bisectoare $y = x \Rightarrow$ panta este $m = 1$</p> <p>$\Rightarrow f'(x_0) = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$</p> <p>punctul de tangență va fi $T\left(\frac{1}{3}, \frac{7}{3} - \ln 3\right)$</p> <p>ecuația tangentei $x - y + 2 - \ln 3 = 0$</p>	1p 1p 1p 2p
2. a)	$f\left(-\sqrt[4]{x}\right) = \sqrt{x} + 2\sqrt[4]{x} - 3$ $\int_1^{16} f\left(-\sqrt[4]{x}\right) dx = \left(\frac{2}{3}\sqrt{x^3} + \frac{8}{5}\sqrt[4]{x^5} - 3x\right)\Big _1^{16}$ <p>calculând obținem $\frac{233}{5}$</p>	1p 2p 2p
b)	$V = \pi \int_0^3 g^2(x) dx \Rightarrow V = \pi \int_0^3 \sqrt{-x^2 + 2x + 3} dx$	1p

	$I = \int_0^3 \sqrt{-x^2 + 2x + 3} dx = \int_0^3 \sqrt{4 - (x-1)^2} dx$ <p>realizând schimbarea de variabilă $t = x - 1 \Rightarrow I = \int_{-1}^2 \sqrt{4 - t^2} dt$</p> <p>aplicând metoda integrării prin părți obținem $I = \left(\frac{t}{2} \sqrt{4 - t^2} + 2 \arcsin \frac{t}{2} \right) \Big _{-1}^2$</p> $V = \pi\sqrt{3} + \frac{4\pi^2}{3}$	1p
		2p
		1p
c)	$a_n = \int_n^{n+1} \left(1 - \frac{4}{x^2} \right) dx$ $a_n = 1 - \frac{4}{n(n+1)}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{n^2} = e^{-4}$	1p
		2p
		2p