

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Varianta 8

Prof. Badea Ion

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$N = \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^{2012} - 1}{-\frac{1}{3} - 1} : \frac{3^{2012} - 1}{3^{2012}} =$ $= \frac{3}{2}$	3p 2p
2.	a și b sunt soluțiile ecuației $x^2 - x - 12 = 0$ $\Rightarrow$ numerele sunt -3 și 4	3p 2p
3.	$2 \log_2 x - 1 \leq 3$ $\Leftrightarrow \log_2 x \leq 2$ $\Leftrightarrow x \leq 4$ $\Rightarrow x \in \{1, 2, 3, 4\}$	1p 1p 2p 1p
4.	$x - \frac{20}{100}x = \frac{4}{5}x$ $\frac{110}{100} \cdot \frac{4}{5}x = 1760$ $x = 2000$	1p 2p 2p
5.	M mijlocul lui $(AB) \Rightarrow M(1,2)$ $m_{AB} = \frac{1}{2}$ d mediatoarea $\Rightarrow m_d = -2$ $d : 2x + y - 4 = 0$	1p 1p 1p 2p
6.	$\sin 0^\circ = 0, \sin 90^\circ = 1$ $\sin^2 15^\circ + \sin^2 75^\circ = \sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ = 1$ $\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ = 1$ $\sin^2 45^\circ = \frac{1}{2}$ $S = \frac{7}{2}$	1p 1p 1p 1p 1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\det A = 4 + m^2 - m^2 + 2m - 2m - m^2$ $= 4 - m^2$	3p 2p
b)	(S)sistemul este compatibil determinat $\Leftrightarrow \det A \neq 0$ $4 - m^2 \neq 0 \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$	2p 3p
c)	$m = 0 \Rightarrow \det A = 4$ $d_x = 4, d_y = 4, d_z = -4 \Rightarrow$ $\Rightarrow (x, y, z) \in \{(1, 1, -1)\}$	1p 3p 1p
2. a)	$f_{a,b}: (X-1) \Leftrightarrow f_{a,b}(1) = 0$ $f_{a,b}(1) = 2a^2 - 2ab + b^2 + 2a + 1 = (a-b)^2 + (a-1)^2$ $(a-b)^2 + (a-1)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (a-b)^2 = 0 \\ (a-1)^2 = 0 \end{cases}$ $\Rightarrow a = b = 1$	1p 2p 2p 1p
b)	x_1, x_2, x_3 rădăcinile polinomului $f_{1,1} = 2X^3 - 2X^2 + X - 1 \Rightarrow$ $\begin{cases} s_1 = x_1 + x_2 + x_3 = 1; s_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{1}{2}; s_3 = x_1x_2x_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$ $S_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = s_1^2 - 2s_2 = 0$ $\begin{cases} 2x_1^3 - 2x_1^2 + x_1 - 1 = 0 \\ 2x_2^3 - 2x_2^2 + x_2 - 1 = 0 \\ 2x_3^3 - 2x_3^2 + x_3 - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1^3 = 2x_1^2 - x_1 + 1 \\ 2x_2^3 = 2x_2^2 - x_2 + 1 \\ 2x_3^3 = 2x_3^2 - x_3 + 1 \end{cases}$ $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = \frac{1}{2}(2S_2 - s_1 + 3) = 1$	1p 1p 1p 1p 1p
c)	$2 \cdot 8^x - 2^{2x+1} + 2^x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 2^{3x} - 2 \cdot 2^{2x} + 2^x - 1 = 0$ Notăm $2^x = t \Rightarrow 2t^3 - 2t^2 + t - 1 = 0$ $\Rightarrow (t-1)(2t^2+1) = 0 \Rightarrow t = 1$ $2^x = 1 \Rightarrow x = 0$	2p 1p 1p 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f'(x) = (x\sqrt{3} - 2)^3$ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ $\Rightarrow f$ strict descrescătoare pe $\left[-2, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$ și strict crescătoare pe $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right]$	1p 2p 2p
----------	--	----------------

b)	Fie pantele celor două tangente $m_1 = f' \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right) = -1$ $m_2 = f'(\sqrt{3}) = 1$ $m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow \text{cele două tangente sunt perpendiculare}$	1p 1p 1p 2p
c)	$\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \left(f'(x) \right)^{\frac{1}{x-\sqrt{3}}} \stackrel{(1^\infty)}{=} \lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \left[\left(1 + \left(f'(x) - 1 \right) \right)^{\frac{1}{f'(x)-1}} \right]^{\frac{f'(x)-1}{x-\sqrt{3}}} =$ $= e^{\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{(x\sqrt{3}-2)^3 - 1}{x-\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{0}{0} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \frac{(x\sqrt{3}-3) \left[(x\sqrt{3}-2)^2 + (x\sqrt{3}-2) + 1 \right]}{x-\sqrt{3}}} =$ $= e^{\lim_{x \rightarrow \sqrt{3}} \sqrt{3} \left((x\sqrt{3}-2)^2 + (x\sqrt{3}-2) + 1 \right)} = e^{3\sqrt{3}}$	2p 2p 1p
2. a)	$\int_{-1}^1 (x+2) f_1(x) dx = \int_{-1}^1 (x-1) dx =$ $= \left(\frac{x^2}{2} - x \right) \Big _{-1}^1 =$ $= -2$	1p 2p 2p
b)	$I_1 = \int_{-1}^1 \frac{x-1}{x+2} dx = \int_{-1}^1 \left(1 - \frac{3}{x+2} \right) dx =$ $= x \Big _{-1}^1 - 3 \ln x+2 \Big _{-1}^1 = 2 - 3 \ln 3$	3p 2p
c)	$\Leftrightarrow I_{n+1} + 3I_n = \int_{-1}^1 \frac{(x-1)^{n+1} + 3(x-1)^n}{x+2} dx =$ $= \int_{-1}^1 (x-1)^n dx = \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} \Big _{-1}^1 =$ $= \frac{(-2)^{n+2}}{n+1}, (\forall) n \in \mathbb{N}^*$	2p 2p 1p