

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Varianta 82

Prof: Stoica Alina Codruța

- ♦ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ♦ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ♦ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$\log_2 5 - \log_2 3 = \log_2 \frac{5}{3}$ $\log_2 \frac{5}{3} + \log_2 \frac{12}{5} = \log_2 4$ $\log_2 4 = \log_2 2^2 = 2 \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2$	2p 2p 1p
2.	$T_{k+1} = C_8^k \sqrt{2}^k = C_8^k 2^{\frac{k}{2}}$ $\frac{k}{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow k \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ avem 5 termeni raționali Dezvoltarea are 9 termeni, deci 4 termeni vor fi iraționali	2p 2p 1p
3.	$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{z} = a - bi$ $3a - bi = 6 + i$ $a = 2, b = -1$	1p 2p 2p
4.	$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-1 - 4 + m)^2 + (2 - 4 - m)^2}$ $\sqrt{(m - 5)^2 + (m + 2)^2} = 5$ $m^2 - 3m + 2 = 0$ cu soluțiile $m_1 = 1$ și $m_2 = 2$.	2p 2p 1p
5.	$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ $\sqrt{(5 - m)^2 + (2 + m)^2} = 5$	2p 1p 2p

	$m^2 - 3m + 2 = 0$ cu soluțiile $m_1 = 1$ și $m_2 = 2$	
6.	$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 6^2 + 4^2 - 2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ$ $a^2 = 36 + 16 - 48 \cdot \frac{1}{2} = 28 \Rightarrow a = 2\sqrt{7}$ $p = 10 + 2\sqrt{7}$	2p 1p 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	Dacă $x = 0$ avem $A(0) = \begin{pmatrix} 2014^0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A(0) = I_3 \Rightarrow I_3 \in G$	2p 3p
b)	Pentru $x, y \in \mathbb{R}$ avem $A(x)A(y) = \begin{pmatrix} 2014^x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2014^y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A(x)A(y) = \begin{pmatrix} 2014^{x+y} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x+y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in G, x+y \in \mathbb{R}$	3p 2p
c)	$A^2(x) = A(x)A(x) = A(2x) = \begin{pmatrix} 2014^{2x} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\det A^2(x) = \begin{vmatrix} 2014^{2x} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2x \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow$ $2014^{2x} = 2014 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$	2p 2p 1p
2.	$x, y \in (3, +\infty) \Rightarrow x - 3 > 0, y - 3 > 0$	2p
a)	$x \circ y = xy - 3x - 3y + 12 = (x - 3)(y - 3) + 3 > 3 \Rightarrow x \circ y \in (3, +\infty)$	3p

b)	$x \circ x = x \Rightarrow x^2 - 3x - 3x + 12 = x$ $\Rightarrow x^2 - 7x + 12 = 0$ cu soluțiile $x_1 = 3$ și $x_1 = 4$	3p 2p
c)	<p>Verificăm dacă $f(x+y) = f(x) \circ f(y)$ $f(x+y) = e^{x+y} + 3$</p> $f(x) \circ f(y) = (f(x) - 3)(f(y) - 3) + 3 = (e^x + 3 - 3)(e^y + 3 - 3) + 3 = e^x \cdot e^y + 3 = e^{x+y} + 3$ <p>Fie $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, din $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow e^{x_1} + 3 = e^{x_2} + 3 \Rightarrow e^{x_1} = e^{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$ deci f injectivă</p> <p>Din $f(x) = y \Rightarrow e^x + 3 = y \Rightarrow e^x = y - 3 \Rightarrow x = \ln(y - 3) \in \mathbb{R}$ pentru $y \in (3, +\infty)$ deci f surjectivă</p> <p>Așadar f bijectivă</p> <p>Cum f este morfism bijectiv rezultă că f este izomorfism de grupuri.</p>	2p 1p 1p 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$\cos \frac{1}{x}$ este funcție mărginită $-1 \leq \cos \frac{1}{x} \leq 1$ $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x} = 0$ f este continuă	2p 2p 1p
b)	$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ $f'(0) = 0$	2p 3p
c)	$a_n = \frac{1}{n^3} \cos n^3 + \frac{2}{n^3} \cos \frac{n^3}{2} + \frac{3}{n^3} \cos \frac{n^3}{3} + \dots + \frac{n}{n^3} \cos \frac{n^3}{n}$ $ a_n \leq \frac{n+1}{2n^2}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n^2} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$	1p 2p 2p
2. a)	<p>Dacă $F : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ este o primitivă a lui $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ atunci F este derivabilă pe $(0, +\infty)$ și</p> $F'(x) = f(x), \forall x \in (0, +\infty)$ $F'(x) = f(x) = \ln x - x$	1p 1p

	$F''(x) = f'(x) = (\ln x - x)' = (\ln x)' - x' = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ $\frac{1-x}{x} < 0 \text{ pentru } x \in (1, +\infty), \text{ deci } F \text{ concavă pe } (1, +\infty)$	2p 1p
b)	$\int (x - f(x) + \ln x)^2 dx = \int (x - \ln x + x + \ln x)^2 dx =$ $= \int (2x)^2 dx = \int 4x^2 dx =$ $= 4 \frac{x^3}{3} + C$	2p 2p 1p
c)	$g(x) = \frac{f(x)}{x} = \frac{\ln x - x}{x} = \frac{1}{x} \ln x - 1$ $G(x) = \int g(x) dx = \int \left(\frac{1}{x} \ln x - 1 \right) dx = \int \frac{1}{x} \ln x dx - \int dx = \int (\ln x)' (\ln x) dx - \int dx = \frac{\ln^2 x}{2} - x + C$ $G(1) = \frac{\ln^2 1}{2} - 1 + C = -1 + C$ $-1 + C = \frac{1}{2} \Rightarrow C = \frac{3}{2} \text{ deci } G(x) = \frac{\ln^2 x}{2} - x + \frac{3}{2}$	1p 2p 1p 1p