

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 93**

Prof: Tomiță Liliana

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$[x] = y; y \in \mathbb{Z}; 2y^2 - 3y + 1 = 0; y_1 = 1; y_2 = \frac{1}{2}$ $y \in \mathbb{Z} \Rightarrow y = 1 \Rightarrow [x] = 1 \Rightarrow x \in [1, 2)$	3p 2p
2.	$z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ $r = z = 2, \alpha = \frac{5\pi}{3}$ $z = 2\left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}\right)$	1p 3p 1p
3.	$T_{k+1} = C_{100}^k \left(\sqrt[3]{x}\right)^{100-k} \cdot (\sqrt{a})^k$ $\frac{100-k}{3} = 5, k = 85$ $T_{86} = C_{100}^{85} x^5 a^{42} \sqrt{a}$	1p 2p 2p
4.	$\frac{\sin a}{\cos a} = \frac{1}{3} \Rightarrow \cos a = 3 \sin a$ $\sin^2 a + \cos^2 a = 1, a \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right); \cos a = \frac{3\sqrt{10}}{10}$	2p 3p
5.	$\vec{u} \cdot \vec{v} = -8$ $-8 < 0 \Rightarrow \text{concluzia}$	2p 3p
6.	$m_{BC} = -2$	2p

$y - y_A = m_{BC}(x - x_A)$	1p
$y = -2x + 11$	2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. a)	$\alpha\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ $\beta\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ $\alpha\beta \neq \beta\alpha$	2p 2p 1p
b)	$x = \beta\alpha^{-1}; \alpha^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ $x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	3p 2p
c)	$\beta^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $x \in \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \right\}$	2p 1p 2p
2.	$a=1 \Rightarrow f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$	1p
a)	$f(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 + (-1) - 1 = -1 - 1 - 1 - 1$ $f(-1) = -4$	3p 1p
b)	$a=1 \Rightarrow x^3 - x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^2+1) = 0$ $x_1 = 1, x_2 = -i, x_3 = i$	3p 2p
c)	$x_1 + x_2 + x_3 = 1; \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = a; \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 - 2a$	2p

$x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - a(x_1 + x_2 + x_3) + 3$	2p
$10 = 1 - 2a - a \cdot 1 + 3$	
$a = -2$	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a)	$f(x) = 3x^5 + 15x^4 - 10x^3 - 90x^2 + x + 1$ $f'(x) = 3 \cdot 5x^4 + 15 \cdot 4x^3 - 10 \cdot 3x^2 - 90 \cdot 2x + 1$ $f'(x) = 15x^4 + 60x^3 - 30x^2 - 180x + 1$	2p 2p 1p
b)	$f'(x) = 15x^4 + 60x^3 - 30x^2 - 180x + m$ $f''(x) = 60x^3 + 180x^2 - 60x - 180$ $f''(x) = 0 \Rightarrow x_1 = 1; x_2 = -1; x_3 = -3$	1p 1p 3p
c)	f continuă $f''(x) > 0, (\forall) x \in (-3, -1) \cup (1, \infty); f''(x) < 0, (\forall) x \in (-\infty, -3) \cup (-1, 1)$ Punctele de inflexiune : $A(-3; -54 - 3m + n); B(-1; -68 - m + n); C(1; -82 + m + n)$ $\begin{vmatrix} -3 & -54 - 3m + n & 1 \\ -1 & -68 - m + n & 1 \\ 1 & -82 + m + n & 1 \end{vmatrix} = 0$	1p 2p 2p
2. a)	$\mathcal{I}_1 = \int_0^1 (1+x)2^x dx = (1+x) \frac{2^x}{\ln 2} \Big _0^1 - \int_0^1 \frac{2^x}{\ln 2} dx$ $= \frac{3}{\ln 2} - \frac{1}{\ln^2 2}$	3p 2p
b)	$\mathcal{I}_{n+1} - \mathcal{I}_n = \int_0^1 (1+x)^n \cdot x \cdot 2^x dx$ $(1+x)^n \cdot x \cdot 2^x \geq 0, (\forall) x \in [0, 1] \Rightarrow (\mathcal{I}_n)_{n \geq 1}$ șir crescător	3p 2p

c)	$\mathcal{I}_n = (1+x)^n \frac{2^x}{\ln 2} \Big _0^1 - \int_0^1 n(1+x)^{n-1} \frac{2^x}{\ln 2} dx$	2p
	$\mathcal{I}_n = \frac{2^n \cdot 2}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} - \frac{n}{\ln 2} \mathcal{I}_{n-1}$	2p
	$\mathcal{I}_n \cdot \ln 2 = 2^{n+1} - 1 - n \mathcal{I}_{n-1}$	1p

www.mateinfo.ro