

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**Varianta 95**

Prof: Tomiță Liliana

- ◆ Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- ◆ Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- ◆ Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1.	$\log_{\sqrt{3}} 9\sqrt{3} = \log_{\sqrt{3}} \sqrt{3^5}$ $\log_{\sqrt{3}} 9\sqrt{3} = 5$	3p 2p
2.	$z^4 = 81$ $z^2 = 9; z^2 = 9i^2$ $z_1 = 3; z_2 = -3; z_3 = 3i; z_4 = -3i$	1p 2p 2p
3.	$\Delta = 4$ $G_f \cap Ox = \{A(1,0); B(3,0)\}$ $f(0) = 3 \Rightarrow G_f \cap Oy = \{C(0,3)\}$	1p 2p 2p
4.	$A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$ $A = \frac{9\sqrt{3}}{4}$	3p 2p
5.	$f : \{1, 2, 3, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, 10\}, f$ surjectivă $\Rightarrow f$ bijectivă $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = 1$	2p 3p
6.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = 2 \cdot \overrightarrow{AC}$ $ 2 \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \cdot AC$	2p 1p

	$AC = \sqrt{29} \Rightarrow \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{BC} = 2\sqrt{29}$	2p
--	--	----

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1.	$\det A = 0$	2p
a)	$\text{rang } A = 1$	3p
b)	$A^2 = 10A$	2p
	$P(n): A^n = 10^{n-1}A, (\forall)n \geq 2$ (demonstrația)	2p
	$A^{2014} = 10^{2013}A$	1p
c)	$\det B = 11$	2p
	$B^{-1} = \frac{1}{11} \cdot \begin{pmatrix} 8 & -2 & -1 \\ -6 & 7 & -2 \\ -9 & -6 & 8 \end{pmatrix}$	3p
2.	$f(X) = X^4 + 4X^3$	1p
a)	$x^4 + 4x^3 = 0 \Rightarrow x^3(x+4) = 0$	2p
	$x_1 = x_2 = x_3 = 0, x_4 = -4$	2p
b)	$x_1 = x_2 = m + n\sqrt{3}, x_3 = x_4 = m - n\sqrt{3}$ rădăcinile lui f	1p
	$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -4 \Rightarrow m = -1; x_1x_3 = x_2x_4 = m^2 - 3n^2 = 1 - 3n^2$	1p
	$(x_1 + x_3)(x_2 + x_4) + x_1x_3 + x_2x_4 = 0 \Rightarrow n = 1 \text{ sau } n = -1$	1p
	$a = 2, b = 1$	2p
c)	$f'(x) = 4x^3 + 12x^2 - 4a$	2p
	$x = 1$ rădăcină dublă $\Rightarrow f(1) = 0$ și $f'(1) = 0$	2p
	$a = 4, b = \frac{11}{4}$	1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1.	f continuă	2p
a)	$f'(x) = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$	2p
	f derivabilă pe $(0,2)$	1p
b)	$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1 \in [0,2]$	1p
	$f'(x) > 0, (\forall) x \in (0,1)$	1p
	$f'(x) < 0, (\forall) x \in (1,2)$	1p
	$A(1;1)$ punct de maxim	
	$B(0,0); C(2,0)$ puncte de minim	2p
c)	$f''(x) = \frac{1}{(x^2-2x)\sqrt{2x-x^2}}, x \in (0,2)$	2p
	$f''(x) < 0, (\forall) x \in (0,2)$	2p
	f concavă	1p
2.	$\mathcal{I}_1 = -\cos x + C$	1p
a)	$\mathcal{I}_2 = \frac{2x - \sin 2x}{4} + C$	2p
	$\mathcal{I}_3 = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$	2p
b)	$\mathcal{I}_n = \int \sin^{n-1} x (-\cos x)' dx$	1p
	$\mathcal{I}_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)(\mathcal{I}_{n-2} - \mathcal{I}_n)$	2p
	$n\mathcal{I}_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)\mathcal{I}_{n-2}$	2p
c)	$24\mathcal{I}_6 = -4\sin^5 x \cos x + 20\mathcal{I}_4; 20\mathcal{I}_4 = -5\sin^3 x \cos x + 15\mathcal{I}_2$	2p

$15\mathcal{I}_2 = \frac{15}{4}(2x - \sin 2x) + C$	1p
$24\mathcal{I}_6 = -4\sin^5 x \cos x - 5\sin^3 x \cos x + \frac{15}{2}x - \frac{15}{2}\sin x \cos x + C$	2p

www.mateinfo.ro